

Alumna: Catalina Morales Santis

Catedrático: Lic. Mahonrry Ruiz Guillén

Catedra: Enfermería Médico quirúrgica I

Actividad: Ensayo

Licenciatura: Enfermería

Grupo: A                      cuatrimestre: 6to

Modalidad: Semiescolarizado

### **Apendicitis**

La apendicitis es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen.

Provoca dolor en el abdomen bajo derecho. Sin embargo en la mayoría de las personas, el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza. A medida que la inflamación empeora, el dolor de apendicitis por lo general incrementa y finalmente se hace intenso. Por lo regular la apendicitis se da entre los 10 y 30 años de edad. El tratamiento estándar para ello es la extirpación quirúrgica del apéndice.

Los síntomas de la apendicitis son los siguientes: Dolor repentino que comienza en el lado derecho del parte inferior del abdomen, dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y a menudo se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen, dolor que empeora

cuando toses ,caminas o realizas movimientos bruscos, náuseas y vómitos, pérdida de apetito, estreñimiento o diarrea, hinchazón abdominal, flatulencia. El lugar del dolor puede variar dependiendo de la edad.

La causa probable de una apendicitis , es una obstrucción en el recubrimiento del apéndice e que da como resultado una infección. Las bacterias se multiplican rápidamente y hacen que el apendicitis e se inflame. La apendicitis puede contener ciertas complicaciones ,se puede perforar el apéndice y la acumulación de pus que deforma en el abdomen. El diagnóstico a seguir sería la exploración física para poder evaluar el dolor, análisis de sangre, análisis de orina, pruebas de diagnóstico por imágenes.

Tratamiento: realizar una apendicetomía ,la cual consiste en la extracción de la apendicitis e inflamada, o bien una cirugía laparoscópica.

### **Colecistitis**

La colecistitis es una inflamación en la vesícula. La vesícula es un órgano pequeño, en forma de pera, ubicado en la zona derecha del abdomen por debajo del hígado. Generalmente la colecistitis se produce por cálculos biliares que obstruyen el tubo que sale de vesícula.

Algunos de los síntomas que pueden presentarse son: dolor intenso en la parte superior derecha o en el centro del abdomen, dolor se extiende al hombro derecho la espalda, náuseas, vómitos, fiebre, estos signos y síntomas aparecen regularmente después de la comida. Causas de la colecistitis, ocurre cuando la vesícula se inflama, cálculos biliares, tumores, obstrucción de las vías biliares, problemas en los vasos sanguíneos, e infecciones como el sida.

Diagnostico: análisis de sangre, pruebas de diagnóstico por imágenes de la vesícula, una exploración que muestra el movimiento de la bilis en el cuerpo. El tratamiento es el siguiente: ayuno, administración de líquidos a través de una vena del brazo, antibióticos para combatir la infección, analgésicos o bien una cirugía que consiste en la extracción de la vesícula(colecistectomía).

### **Colelitiasis**

También conocido como cálculos biliares, son depósitos sólidos que se forman dentro de la vesícula biliar, estos pueden ser muy pequeño como un grano de arena o tan grandes como una pelota de golf. Las principales causas son: cálculos compuestos de colesterol , cálculos compuestos por bilirrubina.

Los cálculos biliares son más comunes en mujeres, nativos estadounidenses y personas de descendencia hispana, personas mayores de 40 años de edad, personas con sobrepeso. Los síntomas de esto son, dolor en la parte superior derecha o media del abdomen durante al menos 30 minutos, fiebre, color amarillento de la piel y de la esclerótica del ojo, heces color arcilla, náuseas y vómitos

El tratamiento de esta es igual a las anteriores, únicamente por intervención quirúrgica (colecistomía laparoscópica, y la colecistomía abierta). Pruebas y exámenes, Ecografía abdominal, ecografía computarizada abdominal, gammagrafía de la vesícula biliar con radionúclidos.