



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



PROFESOR:
MERCOS JHODANY ARGUELLO
MATERIA:
PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA I
MODULO: I
LICENCIATURA:
ENFERMERIA
CUATRIMESTRE:
6°
MODALIDAD:
SEMIESCOLARIZADO

ALUMNO:
SELENE MERCEDES LOPEZ LOPEZ
TRABAJO:
GRAN NOTA



ESTADIO I

ESTAN DICADAS LAS BARRERAS LIQUIDAS O LOS APOSITOS SEMIPERMEABLES



ESTADIO II



ESTADIO III Y IV

DESBRIDAMIENTO EL TEJIDO NECROTICO EN LAS ULCERAS FAVORECE LA INFECCION E IMPIDE LA CURACION

HUMEDAD



DESGARRO DE VASOS




ESCORIAMIENTO DE LA PIEL



PRINCIPALES CAUSAS

INMOVILIDAD



LA APARICION DE LAS UPP SE DEBE REALIZAR UNA BUSQUEDA SISTEMATICA DE LAS MISMAS



ALGUNOS AUTORES SUGIEREN QUE LA IRRIGACION CON FENITOINA PODRIA MEJORAR LA EVOLUCION DE LA ULCERA



ES UNA LESION DE ORIGEN ISQUEMICO, LOCALIZADA EN LA PIEL Y TEJIDOS SUBYACENTES CON PERDIDA DE SUSTANCIA CUTANEA PRODUCIDA POR PRESION PROLONGADA O FRACCION ENTRE DOS PLANOS DUROS

ULCERAS POR PRECION (UPP)

PRESENCIA O AUCENCIA DE TEJIDO DE GRANULACION Y EPITELIZACION

LOCALIZACION


EVALUACION

TEJIDOS NECROTICOS



FASE

TUNELES



TRACTOS SUNUSALES

TAMAÑO