



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



PROFESOR:
RUIZ GUILLEN MAHONRRY
DE JESUS
MATERIA:
ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II
MODULO: I
LICENCIATURA:
ENFERMERIA
CUATRIMESTRE:
6º
MODALIDAD:
SEMIESCOLARIZADO

ALUMNO:
SELENE MERCEDES LOPEZ LOPEZ
TRABAJO:
CUADRO SINOPTICO

Técnica de lavado de manos básico

El lavado de manos es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas

Técnica de lavado de manos básico

El lavado de manos es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas

Seguida de un aclarado con agua abundante

con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica

flora transitoria y residente

así evitar la transmisión de estos microorganismos de persona a persona

Lavado de manos clínico con antiséptico

Es el que se realiza con una solución jabonosa antiséptica de amplio espectro microbiano

El lavado de manos antiséptico es el método más efectivo

Remover o eliminar los microorganismos transitorios adquiridos por contacto reciente con los pacientes o material contaminado

Técnica básica

Humedecer las manos con agua

Aplicar de 3 – 5 ml de jabón antiséptico.

Frotar vigorosamente por 15 a 30 segundos cubriendo toda la superficie de la mano, espacios interdigitales hasta la muñeca

Seque posteriormente con una toalla de papel por mano

Use toalla para cerrar el grifo, si es necesario

Indicaciones

Al llegar y al salir del hospital

Curación de heridas

Preparación de soluciones parenterales

Administrar medicación parenteral

Aspirar secreciones de vías respiratorias

Administrar y/o manipular sangre y sus derivados

Técnica de lavado de manos quirúrgico

Prevenir la contaminación del sitio quirúrgico mediante la remoción y destrucción de microorganismos transitorios y la reducción de la flora residente presentes en las manos del equipo quirúrgico

Técnica básica

La llave se accionara con pedal o con el codo o célula fotoeléctrica

Mojar las manos con agua, aplicar el jabón antiséptico 3- 5ml,

Frotar las manos, palma con palma, palma derecha con dorso de mano izquierda y palma izquierda con dorso de mano derecha, los espacios interdigitales de mano derecha y luego de mano izquierda

Con movimientos rotatorios descienda por el antebrazo derecho hasta 6 cm por encima del codo y luego antebrazo izquierdo

Limpie uña por uña, de una mano y luego la otra. Se recomienda el cepillado quirúrgico, incluyendo los lechos ungueales y yema de dedos, durante 2 minutos

Enjuagar las manos manteniéndolas levantadas sobre los codos.

Durante el procedimiento se recomienda mantener los brazos hacia arriba y alejadas del cuerpo favoreciendo el escurrimiento hacia los codos. No tocar superficies o elementos

Este procedimiento se realizara dos veces

La duración del procedimiento es de 5 minutos

Secar las manos y antebrazos con toallas estériles

Ingrese al quirófano dando la espalda a la puerta

infección nosocomial

Las infecciones nosocomiales, también conocidas como infecciones adquiridas en el hospital, ocurren en pacientes que están recibiendo atención médica

Factores

Disminución de la inmunidad entre los pacientes

Creciente variedad de procedimientos médicos

Técnicas invasivas que crean posibles rutas de infección

Transmisión de bacterias resistentes a los medicamentos entre las poblaciones de hospitales abarrotados