



**UNIVERSIDAD
DEL SURESTE**

ENFERMERIA GERONTOGERIATRICA.

**"Pasión^{por}
educar"**

LIC: BEATRIZ GORDILLO.

PRESENTA LA ALUMNA: MARICELA LOPEZ LOPEZ.

6 "B" SEMIESCOLARIZADO.

COMITAN DE DOMINGUEX CHIAPAS A 30 DE MAYO DEL 2020.



DIAGNOSTICO.

Los pacientes con síncope a menudo describen una transición estereotípica desde la conciencia hasta la incontinencia que ocurre al cabo de unos segundos.



ETIOLOGIA.

Se divide en tres grupos:
1-síncope neuromediado.
2-síncope ortostático.
3-síncope cardíaco.



SINCOPE

El síncope es una pérdida brusca y temporal de la conciencia y el tono postural, de duración breve y recuperación espontánea.

DEFINICION




TRATAMIENTO

Metoprolol 25 a 50 mg.
Atenolol 25 a 50 mg.
Nadolol 10 a 20 mg.
Proxetina 20 a 40 mg.
-sertralina 25 a 50 mg.



-enfermedades cardiovasculares o hipertensión, bajo índice de masa corporal, aumento de ingesta de alcohol, diabetes, la anamnesis.

FACTORES DE RIESGO.



-piel pálida.- aturdimiento.- visión de túnel. -nauseas. - sensación de calor. -sudor frío y húmedo. -bostezos. -visión borrosa.

SIGNOS Y SINTOMAS.

