José Luis Hernández Álvarez

Beatriz Gordillo López

Mapa mental

Enfermería gerontogeriatrica

Grado: 6 cuatrimestre

Grupo: “B”

Bibliografía: antología

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de junio del 2020

Presencia de numerosos problemas o síntomas.

Pronóstico de vida inferior a 6 meses.

Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.

Criterios de situación del enfermo terminal

Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable.

así se defienden de la ansiedad que les crea

Las personas "conviven" con el miedo a la muerte, pero pueden posponer el plantearse el problema, que les resulta angustioso en sumo grado

que no va a desahuciarle por el hecho de ser moribundo pues es una batalla que van a librar juntos paciente familia y personal sanitario sea cual sea el resultado

Es fundamental que haga comprender al paciente que no está todo perdido

Desarrollo del proceso terminal

Actitud del personal de enfermería con pacientes desahuciados

El hombre es conocedor del proceso de vida y sabe que envejece y tiene que morir, pero no quiere envejecer ni morir.

deberíamos ser consciente desde un principio y aceptar como natural el proceso de la vida

Fase: Ira

el proceso terminal se dan distintas fases

Fase: Aceptación

Fase: Negación y Aislamiento

Fase: Depresión

Fase: Pacto

Recomendaciones

Asumir que la profesión de Enfermería brinda a sus profesionales la oportunidad especial de ayudar y confortar al moribundo

Medidas terapéuticas en el paciente terminal

El dolor, aun a pesar de no ser el único síntoma, sí es el que más angustia genera al paciente y a su familia

No ser demasiado estrictos con las normas y protocolos de la institución

Que el Equipo de Salud se proporcione respaldo y comprensión mutuamente

En cuanto a dar información al paciente sobre el pronóstico de su enfermedad

El personal sanitario puede ser una gran ayuda, durante estos momentos finales, si logran comprender los conflictos de la familia en ese momento

Animar al Equipo de Salud a escuchar

ayudan a seleccionar la persona que se sienta más capaz de estar junto al paciente moribundo.