

Elbin Jeremias Velazquez Escalante

5to CUTRIMESTRE "B" LICENCIATURA EN
ENFERMERIA SEMIESCOLARIZADO



DOCENTE: Mahonrry de Jesus Ruiz

MATERIA : Enfermeria Medico Quirurgica

TRABAJO: Mapa Conseptual (varicela)

FECHA: 20/05/2020

Varicela

Infección causada por el virus de la varicela zoster

ETIOLOGIA

Infección viral causada por un hipervirus del género varicellovirus. La taxonomía lo ha denominado virus herpes humano 3 cuyo único reservorio conocido es el hombre

TRANSMISIÓN

Se produce por contacto directo con las lesiones cutáneas y por inhalación de secreciones respiratorias de personas infectadas con el virus, la proliferación viral se produce en los ganglios linfáticos regionales de las vías respiratorias superiores entre 2 a 4 días después de la infección inicial y es seguida por la viremia entre los 4 y 6 días posinfección.

DIAGNOSTICO

Se diagnostica de acuerdo a sus signos clínicos, se reconoce fácilmente por la erupción y los demás síntomas son muy característicos, si es dudoso es necesario realizar estudios de sangre e identificar el virus en el laboratorio.

Deterioro de la integridad cutánea, agentes ambientales, factores somáticos, o de ciencias inmunológicas, evidenciadas por presencia de pequeñas heridas en todo el cuerpo. Dolor, lesión cutánea, y prurito

ETAPA

Periodo de incubación: oscila entre 12 y 20 días.

1ra viremia: contagio y diseminación sanguínea y linfática,

2da viremia: liberación del virus al torrente sanguíneo en grandes dosis

Fase prodrómica:

1 a 3 días, fiebre (38°C a 39°C), malestar general, cefalea, tos, irritación faríngea.

Aparición de la erupción:

Erupción cutánea constituida por lesiones maculo papulosas, eritematosas que en 24hr se convierte en vesículas que contienen líquido,

2-4 días, - costras, 4-6 días se desprenden

Etapa de curación:

Pequeñas cicatrices

CUADRO CLÍNICO

El signo más característico de la varicela es una erupción en la piel que aparece en forma de pequeños granos que en poco tiempo se convierte en vesículas, suelen aparecer primero por el tronco de la cara, el cuero cabelludo, extendiéndose por todo el cuerpo.

TRATAMIENTO

Requiere una terapia antiviral y sintomática se realiza con analgésicos, antihistamínicos, y cremas, o lociones que calman el picor, su efecto es transitorio, se recomienda baños tibios para limpiar las heridas, que se producen al rascar las ampollas, y evitar posibles infecciones, en caso de infección bacteriana se recomienda antibióticos.