



**Nombre de alumno: Queili Yedani
Escandón Lopez**

**Nombre del profesor: Gordillo López
Beatriz.**

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

Materia: Gerontogeriatrica

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 6°

Grupo: "C"

Comitán de Domínguez Chiapas a 5 de junio de 2020.

Melanoma maligno

El melanoma, el tipo más grave de cáncer de piel, se forma en las células (melanocitos) que producen melanina, el pigmento que le da color a la piel. El melanoma también puede manifestarse en los ojos y, rara vez, en los órganos internos, como los intestinos.

- Un cambio en un lunar existente
- La formación de un nuevo bulto pigmentado o de aspecto inusual en la piel

El melanoma no siempre comienza como un lunar. También puede aparecer en la piel de aspecto normal.

Angiogénesis

Este proceso se ve afectado críticamente con la edad. Hay una disminución del calibre y número de vasos dérmicos, lo que se manifiesta clínicamente como piel fría y disminución del aporte de nutrientes, quedando propensos a ulceraciones cutáneas.

Tumores malignos

La enfermedad mamaria de Paget se origina de la migración hacia la superficie de la piel de células neoplásicas de un carcinoma de mama y se presenta en mujeres a partir de la cuarta década de la vida, mientras que la enfermedad de Paget extramamaria es propia del viejo y se origina en células pluripotenciales epidérmicas

Úlceras por presión

Las úlceras por presión (UPP) son lesiones que aparecen en la piel por la presión o el roce continuado del cuerpo contra materiales diversos, es posible que aparezcan úlceras por presión en personas que pasan mucho tiempo encamadas o sentadas en la misma postura, pero también a causa del roce de elementos de diagnóstico o tratamiento, como sondas, mascarillas, férulas,

vasos

problemas añadidos que colaboran en su aparición:

- Estancia prolongada en cama o en sillones.
- Falta de movilidad.
- Exceso de humedad a causa de incontinencia urinaria o fecal.
- Bajo nivel de percepción de las lesiones por demencias o problemas cognitivos.

Queratosis

La queratosis actínica es un parche grueso y escamoso en la piel, que se desarrolla después de muchos años de exposición al sol.

Los signos y síntomas de una queratosis actínica son los siguientes:

- Mácula de piel áspera, seca o escamosa de, por lo general, 1 pulgada (2,5 cm) de diámetro
- Mácula plana a ligeramente elevada o bulto en la capa de piel superior
- En algunos casos, una superficie dura, similar a una verruga

Prurito y xerosis

La prevalencia de xerosis en los adultos mayores varía entre el 29,5 y el 58,3%, siendo en algunas series la condición cutánea más frecuente, la etiología exacta se desconoce, pero lo más probable es que sea secundario a cambios en la queratinización y en el contenido de lípidos del estrato córneo, con la consiguiente alteración de la barrera cutánea

La xerosis, por su parte, es la causa más frecuente de prurito en este grupo etario; el prurito se clasifica en agudo o crónico según si persiste durante más o menos de 6 semanas

Dermatosis

El prurito afecta al 50% de la población mayor de 60 años, y la causa más común es la xerosis ya mencionada aunque también puede ser secundario a alguna enfermedad sistémica, como insuficiencia hepática o renal, anemia, distiroidismo, diabetes mellitus, o incluso ser una manifestación paraneoplásica

La uña en el adulto mayor

Con la edad, su composición química se altera. Existe una disminución en el contenido de calcio y de hierro asociado a un aumento del contenido de magnesio; además hay una disminución del contenido de sulfato de colesterol lo que explicaría la fragilidad ungueal

Bibliografía:

[-www.elsevier.es](http://www.elsevier.es) › [es-revista-piel-formacion-continuada-de...](#)

[-www.medigraphic.com](http://www.medigraphic.com) › [pdfs](#) › [facmed](#)

- Antología