



ALUMNA: AGUILAR LOPEZ YOVANI LETICIA

ACADEMICO: LIC RUIZ GUILLEM MAHONRRY DE JESUS

MATERIA: ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICO II

TRABAJO: MAPA CONCEPTUAL (VARICELA)

GRADO: 6° CUATRIMESTRE

GRUPO: "C"



LAS MARGARITAS CHIAPAS A 21 DE MAYO DE 2020



INTRODUCCION

Infección viral muy contagiosa que provoca un sarpullido similar a las ampollas en la piel y que da comezón.

La varicela puede resultar contagiosa para aquellas personas que no hayan sufrido la enfermedad o que no se hayan vacunado.

El síntoma más característico es un sarpullido con picazón similar a una ampolla en la piel. Es posible prevenir la varicela con una vacuna. El tratamiento suele estar orientado a aliviar los síntomas, aunque los grupos de alto riesgo pueden recibir medicamentos antivirales.



VARICELA

EPIDEMIOLOGIA

SE PRESENTA
CON MAS
FRECUENCIA
DURANTE LA
PRIMAVERA

EXISTEN DOS
PICOS:
1° EN MARZO
2° EN MAYO



ENFERMEDAD ALTAMENTE INFECTOCONTAGIOSA

ES CONOCIDA COMO
VARICELA ZOSTER
(HERPES TIPO 3)

FUENTE DE
TRANSMISION:
HUMANOS

FORMA DE TRANSMISION:
PERSONA- PERSONA



PERIODO DE INCUBACION

DE 10 A 21 DIAS

ESTADIOS EVOLUTIVOS:

- PAPULAS
- VESICULAS
- PUSTULAS
- COSTRAS

FACES:

- 1° VIREMIA: SE PRODUCE ALREDEDOR DEL 5° DIA ESTA LLEVA EL VIRUS A LOS ORGANOS DEL SISTEMA VASCULOENDOTELIAL
- 2° VIREMIA: 10-21 DIAS LLEGA A LA PIEL
- 3° FACE: MULTIPLICACION

TIEMPO DE EXPOSICIÓN:

- NIÑOS SUSEPTIBLES DE 5 MIN. A 1 HORA CON EXPOSICIÓN CARA-CARA
- PERSONAL DE SALUD MAS DE 15 MINUTOS CON EL PACIENTE O CONTACTO POR MAS DE 60 MIN CON EL ENFERMO

VARICELA

TRATAMIENTO

SINTOMAS

EL SINTOMA MAS CARACTERISTICO ES UN SALPULLIDO CON PICAZON SIMILAR A UNA AMPOLLA EN LA PIEL

CUADRO TIPICO

CUADRO PODROMICO CON MIALGIAS, ALTRALGIAS, FIEBRE, DOLOR ABDOMINAL Y ESCALOFRIOS

COMPLICACIONES

- VARICELA PROGRESIVA GRAVE
- VARICELA HEMORRAGICA
- VARICELA CRONICA O RECURRENTE



PACIENTES QUE NECESITAN HOSPITALIZACION

- PACIENTES CON COMPLICACIONES RESPIRATORIAS
- PACIENTES CON RIESGO OCULAR
- PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INMUNOCOMPROMETIDOS Y CON AFECCION POR HERPES ZOSTER MULTISEGMENTARIO O DISEMINADA

NO FARMACOLOGICO:

- BAÑO DIARIO
- COMPRESAS FRIAS
- BAÑOS CON ARINA DE AVENA OLEOSA

FARMACOLOGICO:

ADMINISTRACION DE ACICLOVIR VIA ORAL DENTRO DE LAS 24 HORAS

TRATAMIENTO MEDICO EN CASA:

- BAÑO FRIO DURANTE 10 MINUTOS.
- APLICAR CALAMINA EN LAS LESIONES CUTANEAS
- DEBE ACONSEJAR QUE EVITE RASCARSE EN LAS LESIONES
- PARA TRATAMIENTO DE FIEBRE MAYOR A 39°C ADMINISTRAR PARACETAMOL
- DEBE EVITAR LA ADMINISTRACION DE ASPIRINA POR EL RIESGO DE SINDROME DE REYE.
- DIETA BLANDA Y LIQUIDA EN CASO DE LESIONES BUCALES.
- ETC

CONCLUSION
SABEMOS Y CONOCEREMOS MAS A FONDO EL PROCESO DE ESTA ENFERMEDAD YA QUE A SIMPLE VISTA NO PARECE SER TAN GRAVE PERO EN REALIDAD SE DESCATA POR LAS COMPLICACIONES QUE PUEDEN TENER LOS PACIENTES SI EN SU CASO NO SON TRATADOS COMO EL MEDICO INDICA.



BIBLIOGRAFIA

- GUIA DE PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA VARICELA/ FORMATO PDF/ RECUPERADO EL 20/05/202
- IMÁGENES DE INTERNET