



**NOMBRE DE ALUMNA: JERONIMO SALES  
BELLA SOLIMAR**

**NOMBRE DEL PROFESOR: RUIZ GUILLEN  
MAHONRRY DE JESUS**

**NOMBRE DEL TRABAJO: MAPA  
CONCEPTUAL DE “VARICELA”**

**MATERIA: ENFERMERIA MEDICO  
QUIRURGICO II**

PASIÓN POR EDUCAR


**GRADO: QUINTO**

**GRUPO: C**

Comitán de Domínguez Chiapas a 23 de mayo 2020

# VARICELA (HERPEZ SOSTER)

También conocido como *Chickenpox*, enfermedad virídica aguda muy contagiosa producida por *herpes virus* denominada *Herpes zóster*.



## PERIODO DE INCUBACION

A

- Dura por término medio de dos o tres semanas (14- 16 días).
- El periodo prodrómico (1 y 2 días) suele ser leve en el niño y a veces grave en el adulto.
- El periodo exantemático (lesiones que duran poco).

## VIRUS CAUSAL

## TRANSMISION

ES

Contagioso, comunicable de forma directa e indirecta. Como sucede en gran número en enfermedades infecciosas, en este caso hablamos de varicela.

## CONTACTO DIRECTO

- Contacto directo con lesiones cutáneas
- Por las gotitas que se desprenden de las vías respiratorias de las personas afectadas.
- Puede existir transmisiones intrauterinas (síndrome de varicela congénita).

## CONTACTO INDIRECTO

## DIAGNOSTICO

ES

- Por lo general es clínico
- En casos atípicos o en pacientes inmunodeprimidos puede ser necesario recurrir a prueba de laboratorio (cultivo del líquido vesicular)
- Por los datos de la exploración física
- Aspecto típico de las lesiones.

## SINTOMAS

ES

- ✚ Salpullido (cara, pecho y espalda)
- ✚ Vesículas pequeñas (ampollas) rellenas de líquido (se extiende hasta el cuero cabelludo, interior de boca, orejas, parpado y área genital).
- ✚ Prurito
- ✚ Fiebre
- ✚ Fatiga
- ✚ Malestar general
- ✚ Dolor abdominal
- ✚ Cefalea
- ✚ Anorexia

## CAUSAS GRAVE

- Vesículas laríngeas o traqueales
- Disnea
- Disfagia
- Linfadenopatía.

## TRATAMIENTO

ES

- Reposo en cama
- Administración de antipiréticos para disminuir la fiebre
- Aplicación de agentes antiprurigenosos tópicos: compresas húmedas, loción de calamina.
- Antihistamínicos orales para combatir el prurito
- Las vesículas infectadas pueden tratarse con una pomada de neomicina bacitracina.
- Uso de antibióticos vía sistémica
- Un tratamiento preventivo es la vacuna de varicela (niños 12 meses y hasta 12 años deben de recibir dos dosis; 1era dosis de 12 meses a 15 meses de edad, 2da dosis 4 años a 5 años)

- El VVZ es un DNA-virus.
- Forma parte de los 8 virus que pertenecen a la familia de los herpes virus y a la subfamilia *Alfaherpesviridae* género *Varicellovirus*.
- Es un virus muy pequeño (150-200 nm de diámetro y está compuesto por 125.000 pares de bases).

- A través de portadores sanos
- A través de objetos contaminados con el virus.
- De manera nosocomial en hospitales pediátricos.

### AFECTA A:

- Niños principalmente
- Adolescentes (>14 de años)
- Lactantes menores de 1 año
- RN de madre con varicela
- Niños con sistema inmunológico deprimido o enf. Crónica.
- Adultos que no la han padecido.

### COMPLICACIONES

Son cutáneas (sobre infecciones bacterianas de la piel y tejidos blandos producidas en su mayor parte por *Staphylococcus spp* y *Streptococcus pyogenes*), causando:

- ✚ Impétigo
- ✚ Celulitis
- ✚ Miositis
- ✚ Fascitis necrotizante
- ✚ Absceso

Son Neurológicas como:

- Cerebelitis
- Ataxia
- Encefalitis
- Mielitis
- Síndrome de Guillain Barré,
- Parálisis de Bell.
- Síndrome de Ramsay-Hunt

Son Respiratorias como:

- ✓ Otitis
- ✓ Sinusitis
- ✓ Neumonía

Son Hematológicas como:

- Púrpura de Schonlein-Henoch,
- Trombopenia.
- Anemia hemolítica.

Otras son como:

- Síndrome de reye
- Varicela hemorrágica
- Sepsis
- Celulitis
- Hepatitis

## **Bibliografía**

- Diccionario de medicina, Océano Mosby.  
Pág. 1333- 1334.
- <https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/varicela.pdf>
- Cartilla nacional de vacunación