UDS UNIVERSIDAD DEL SURESTE

"Pasión por educar"

Materia:	Enfermería medico quirúrgica II
Carrera:	Licenciatura en enfermería.
Cuatrimestre:	Sexto
Profesor (a):	Ruiz Guillen Mahonrry de Jesús.
Actividad:	"Mapas conceptuale varicela"
No de tarea:	Tarea .
Elaborado por:	Víctor Argenis García Gómez
Grupo:	Grupo: "C"
Modalidad:	Semiescolarizado (sábado)
Lugar y fecha:	Comitán de Domínguez, a 18 de mayo del 2020

Varicela

Causado por → **Virus de varicela Zoster**

Es → **Una enfermedad vírica y contagiosa**

Transmisión

Se produce por → **Contacto directo con las lesiones y por inhalación de secreciones respiratorias de personas infectadas por el virus**

Se produce en → **Ganglios linfáticos regionales de las vías respiratorias**

entre → **2-4 días después de la infección inicial y es seguida por la viremia entre los 4-6 días post-infeccion**

Etiología

Es → **Infección viral**

Causado por → **Herpevirus**

Del genero → **Varicellovirus**

Lo denominan → **Virus herpes humano 3 (HHV-3) cuyo único reservorio es el hombre**

Cuadro clínico

Sus signos son → **Erupción en la piel en forma de granos**

Se convierten en → **Vesículas (ampollas llenas de líquidos)**

Aparecen en → **Primero por el tronco, la cara, el cuero cabelludo, extendiéndose después por todo el cuerpo**

Cuatro etapas

Periodo de incuvacion

Oscila entre 12 y 20 días
1ra viremia: contagio y disminución sanguínea y linfática.
2da viremia: liberación del virus al torrente sanguíneo en grandes dosis.

Fase prodrómica

1 a 3 días.
Fiebre (38°c a 39°c)
Malestar general
Cefalea
Tos
Irritación faríngea

Aparición de la erupción

Erupción cutánea constituida por lesiones maculo papulosa, eritematosas que en 24hr se transforman en vesículas (que contienen un líquido)

2-4dias-costras, 4-6 días- se desprenden.

Curación

Diagnostico

Se diagnostica de acuerdo a sus signos clínicos típicos, el medico suele reconocer fácilmente la varicela por erupcion y los demás síntomas son muy característicos. Solo para casos dudosos es necesario realizar una medición de los valores de anticuerpos en la sangre e identificar el virus en el laboratorio

Deterioro de la integridad cutánea R/C, Agentes ambientales, factores somáticos o deficiencias inmunológicas, evidenciado por pequeñas heridas en todo el cuerpo.

Tratamiento

Requiere una terapia antiviral y sintomática. La terapia sintomática se realiza con analgésicos, antihistamínicos y cremas o lociones que calman el picor. Su efecto es paliativo y transitorio. También son recomendables las compresas húmedas o los baños tibios para limpiar las heridas que se producen al rascar las ampollas y evitar posibles infecciones. En caso de infección bacteriana se administrarán antibióticos