Nombre de alumno: marco Antonio Pérez barrios

Nombre del profesor: Ruiz guillen mahonrry de Jesús

Nombre del trabajo: mapa conceptual

Materia: enfermería del adulto

Grado: 6

Grupo: C

Esguince: los ligamentos se desgarran de manera incompleta

Signos de un esguince: dolor, tumefacción rápida, calor, discapacidad, cambios de coloración, limitación en la movilidad

Zonas afectadas: en cualquier parte puedes desguinzarte pero es más frecuente en el tobillo, o rodilla y codo

Zona de la lesión: ocurre en la región lateral del mismo cuando el pie se gira hacia dentro estando de pie

Diagnóstico: en los esguinces no es necesario a tener que tomar una radiografía ya que la lesión no están grave (no amerita)

Tratamiento: no requiere de un tratamiento muy complejo solamente inmovilización de la zona afectada y se le pondrán vendas fijas, férulas o yeso, administración de antiinflamatorios y analgésicos

Esguince, luxación, fractura

Luxación: también llamada dislocación, es el desplazamiento o separación de los extremos de las articulaciones a causa de un traumatismo intenso

Zonas afectadas: en las articulaciones acromio clavicular y del hombro

Las luxaciones pueden ser congénitas, traumáticas o patológicas
Las luxaciones congénitas ocurren en la cadera y la rodilla

Diagnóstico: se basa en la historia clínica, la exploración física y los hallazgos radiológicos

Síntomas: olor, deformidad y limitación al movimiento

Tratamiento: administración de analgésico y antiinflamatorio y relajantes musculares

Fractura: también llamada desgarro y es la ruptura parcial o completa de las fibras musculares a causa de un fuerte impacto

Grado 1: rompimiento de alguna fibra muscular molestia ligera y una tumefacción mínima con movilidad completa

Grado 2: ruptura moderada de fibras de musculo y del tendón dolorosa, tumefacción y pérdida de la movilidad

Grado 3: es la ruptura completa del vientre muscular de la unión miotendinosa o de la inserción del tendón incapacidad de la movilidad, dolor intenso

Síntomas: dolor, hipersensibilidad en el sitio de disrupción ósea, Tumefacción, pérdida de la función, deformidad de la región afectada y movilidad anómala

Diagnóstico: para la atención de las fracturas, se basa en la historia y las Manifestaciones clínicas, La evaluación radiológica se utiliza para confirmar el diagnóstico y para dirigir el tratamiento

Tratamiento: requiere de tornillos especiales para que el hueso pueda compactarse o tener fuerza para realizar movimientos no bruscos ya que puede ocasionar dolores fuertes (método quirúrgico)