



Nombre de alumnos: Amairani Gabriela
Guirao López.

Nombre del profesor: Rodolfo Bataz Morales.

Nombre del trabajo: súper notas

Materia: Grado: 6to

Grupo: Domingos

Comitán de Domínguez Chiapas a 07 de junio de 2020.

Psicopatología

Fobias específicas



Fobias específicas

el miedo intenso a un tipo particular de animal (por ejemplo, las víboras, los perros o las ratas),

Las personas con fobias específicas suelen experimentar una mayor activación fisiológica cuando prevén o se exponen a un objeto o situación fóbica. La fobia específica, en ocasiones, se desarrolla tras un acontecimiento traumático (p. ej., haber sido atacado por un animal o atrapado en un ascensor)



Las personas con fobia específica tienen mayor riesgo de desarrollar otros trastornos, entre los que están los demás trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y bipolares, los trastornos por consumo de sustancias, los síntomas somáticos y trastornos relacionados, y los trastornos de la personalidad (especialmente el trastorno de la personalidad dependiente).



TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA



ANSIEDAD GENERALIZADA

Es una ansiedad y una preocupación excesivas (anticipación aprensiva) acerca de una serie de acontecimientos o actividades. La intensidad, la duración o la frecuencia de la ansiedad y la preocupación es desproporcionada a la probabilidad o al impacto real del suceso anticipado.



El trastorno de ansiedad generalizada también experimentan síntomas somáticos (p. ej., sudoración, náuseas y diarrea) y una respuesta de sobresalto exagerada. Los síntomas de hiperactividad vegetativa (p. ej., el ritmo cardíaco acelerado, dificultad para respirar, mareos) son menos prominentes en el trastorno de ansiedad generalizada que en otros trastornos de ansiedad, como el trastorno de pánico.



El trastorno de ansiedad generalizada se diagnostica más frecuentemente en las mujeres que en los varones (alrededor del 55-60% de quienes presentan el trastorno son mujeres). En los estudios epidemiológicos, aproximadamente dos tercios son mujeres.



En los niños y los adolescentes con trastorno de ansiedad generalizada, las inquietudes y las preocupaciones a menudo se refieren a la calidad de su rendimiento o a su competencia en la escuela o las actividades deportivas, incluso si el rendimiento no está siendo evaluado por los demás.

TRASTORNO DE PÁNICO

Ataques de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos



SE PUEDEN OBSERVAR SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE LA CULTURA (P. EJ., ACÚFENOS, DOLOR DE CUELLO, DOLOR DE CABEZA, GRITOS O LLANTO INCONTROLABLE).



EMOCIONES

Sensación de estar fuera de la realidad y de peligro inminente. Dificultad para iniciar el sueño, miedo a morir, perder el control, volverse loco.



Ansiedad anticipatoria. surge del miedo a tener ataque de pánico en el futuro, temblores, sudoración taquicardia dolor de pecho.

Los ataques de pánico y un diagnóstico de trastorno de pánico en los últimos 12 meses están relacionados con una mayor tasa de intentos de suicidio y de ideación suicida en los últimos 12 meses. Incluso se consideran la comorbilidad, los antecedentes de maltrato infantil y otros factores de riesgo de suicidio.

TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL

EL INDIVIDUO CON FOBIA SOCIAL, TEME ACTUAR O MOSTRARSE DE UNA DETERMINADA MANERA, O MANIFESTAR SÍNTOMAS DE ANSIEDAD QUE SERÁN EVALUADOS NEGATIVAMENTE POR LOS DEMÁS, COMO RUBOR, TEMBLORES, SUDORACIÓN, TRABARSE CON LAS PALABRAS, O NO PODER MANTENER LA MIRADA



LOS INDIVIDUOS CON TRASTORNO DE ANSIEDAD SOCIAL PUEDEN SER INADECUADAMENTE ASERTIVOS O EXCESIVAMENTE SUMISOS, O, CON MENOR FRECUENCIA, EJERCER UN GRAN CONTROL SOBRE LAS CONVERSACIONES.



Las mujeres con trastorno de ansiedad social refieren un mayor número de miedos sociales y trastornos depresivos, bipolares y de ansiedad comórbidos, mientras que los varones son más propensos a temer a las citas, a tener un trastorno negativista desafiante o un trastorno de conducta y al uso de alcohol y drogas para aliviar los síntomas del trastorno.

Conducta: permanecer quieto y en silencio o escondido en el fondo para pasar desapercibido, necesidad de andar siempre con un amigo a todas partes.



conciencia excesiva y ansiedad por situaciones sociales cotidianas
preocupación intensa por días semanas meses antes de un evento social a futuro; pensamiento sobre cosas que causan ansiedad.

AMAIRANI GABRIELA GUIRAO
LÓPEZ