



Nombre de alumno: Fabiola Elizabeth Pérez Morales

Nombre del profesor: Bataz Morales Rodolfo

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico del 1.1.

Materia: PSICOPATOLOGÍA I

Grado: 6° cuatrimestre

Grupo: LPS19SDC0118-H

Trastornos de la personalidad según el DSM-V

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Paranoide

Esquizoide

Esquizotípica

Antisocial

Limite

Histriónica

Narcisista

Evitativa

Dependiente

Obsesivo compulsivo

Otros trastornos de personalidad.

La

El

Patrón.

El

La

Patrón de

Patrón de

Patrón de

Es la

Es la

Cambio de la personalidad debido a otra afección médica.

Desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás.

Patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de las emociones en contextos

dominante de deficiencias sociales e interpersonales

Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás.

inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa.

emotividad excesiva y de búsqueda de atención.

grandeza (en la fantasía o en el comportamiento), necesidad de admiración y falta de empatía.

inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa.

Necesidad dominante y excesiva de que le cuiden.

preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal.

Cambio de la personalidad debido a otra afección médica.

Características clínicas

- Sospecha, sin bases.
- Dudas injustificadas.
- Desconfianza.
- Sospecha recurrente.
- Percepción de ataque.
- Rencor persistente.
- Significados amenazantes.

comienza

Edad adulta.

Características clínicas

- No desea relacionarse con otros.
- Solitario.
- Sin interés por el sexo.
- Frio.
- Indiferente.
- Sin amigos.
- No disfruta actividades.

Manifestado por

- Poca capacidad para relaciones estrechas.
- Comportamiento excéntrico.
- Distorsiones

Características clínicas

- Ideas de referencia.
- Pensamiento mágico.
- Experiencias perceptivas inhabituales
- Discursos extraños.
- Ideas paranoides.
- Ansiedad social excesiva.

Se produce.

Antes de los 15 años.

manifestaciones clínicas

- Incumplimiento de normas sociales.
- Engaño.
- Impulsividad o fracaso para planear.
- Irritabilidad/agresividad.
- Desatención de la seguridad propia.
- Ausencia de remordimiento.

manifestaciones clínicas

- Evita el desamparo
- Relaciones interpersonales inestables.
- Alteración de la identidad.
- Impulsividad
- Conductas autolesivas
- Inestabilidad afectiva.
- Ideas paranoides

comienza

En las primeras etapas de la edad adulta.

manifestaciones clínicas

- Comportamiento seductor y provocativo.
- Ser el centro de atención.
- Expresión plana de emociones.
- Aspecto físico.
- Auto dramatización

manifestaciones clínicas

- Sentimientos de grandeza y prepotencia.
- Fantasías de éxito/poder.
- "especial"
- Necesidad excesiva de admiración.
- Sentimientos de privilegio.
- Se aprovecha de los demás.
- Actitud arrogante.
- Carece de empatía.

manifestaciones clínicas

- Evita el contacto interpersonal.
- Poco dispuesto en las relaciones es.
- Se muestra retraído.
- Preocupación a la crítica/rechazo.
- Socialmente inepto.
- Evita tomar riesgos.

comienza

Generalmente en la niñez o infancia, desarrollándose mayormente en la adultez.

provoca

- Comportamiento sumiso.
- Apego exagerado.
- Miedo a la separación.

manifestaciones clínicas

- Dificultad en la toma de decisiones.
- Necesita de los demás.
- Dificultad para expresarse.
- Preocupación al abandono.
- Dificultad para realizar cosas por sí solo.

a expensas de

- Flexibilidad
- Franqueza
- eficiencia

manifestaciones clínicas

- Preocupación por los detalles, listas, normas, etc.
- Dedicación excesiva.
- Perfeccionista.
- Demasiado consciente y escrupuloso.
- Incapaz de deshacerse de objetos.
- Muestra rigidez y abstinencia.

Criterios de diagnóstico.

- Alteración persistente.
- Evidencia de historia clínica.
- Alteración inexplicable.
- Delirium.
- Malestar clínico

Especificaciones

- Tipo labial.
- Tipo desinhibido
- Tipo agresivo.
- Tipo apático.
- Tipo paranoide.
- Tipo combinado.
- Tipo no especificado.