

**Nombre del alumno:**

JOANA YULIBETH RODRIGUEZ DIAZ

**Nombre del profesor:**

LIC. ALFONSO VELASQUEZ PEREZ

**Licenciatura:**

ENFERMERIA

**Materia:**

ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA II

**Nombre del trabajo:** CUADRO SINOPTICO

**ENSAYO DEL TEMA:**

“INFECCIONES URINARIAS”

# INFECCIONES URINARIAS

es la existencia de gérmenes e infecciones patógenos en la orina por infección de la uretra, la vejiga, el riñón o la próstata

## ANTECEDENTES DE LAS IVU

Pacientes multiparas mayores de 35 años

Del 2 al 10% de las embarazadas sin antecedentes, van a desarrollar bacteriuria asintomática

La mortalidad fetal más alta se presenta cuando la infección ocurra los 15 días antes del parto

## BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

Presencia de bacterias en la orina, mayor de 100,000 UFC/ml de orina, en ausencia de síntomas

- E. coli
- Klebsiella
- Enterobacter
- Proteus

- ✓ Parto prematuro.
- ✓ Bajo peso al nacer.
- ✓ Corioamnioitis.
- ✓ Ruptura de membranas placentarias.
- ✓ Pielonefritis.

Consiste en 6 uros cultivos, dos en cada trimestre del embarazo

Más de 100,000 UFC/ml de único microorganismo considerado uropatógeno es suficiente para el diagnóstico

### TRATAMIENTO

- ❖ NITRIFURANTOINA
- ❖ AMOXICILINA
- ❖ FOSFOMICINA

## PIELONEFRITIS AGUDA

Infección de la vía excretora alta, suele presentarse en el último trimestre

Secundaria a una BA no tratada correctamente

- ♣ E. Coli 80%
- ♣ Klebsiella
- ♣ Pseudomonas
- ♣ Streptococcus B hemolítico
- ♣ Estafilococo dorado

- Fiebre de inicio brusco
- Sudación
- Escalofríos
- Náuseas
- Vómito
- Dolor lumbar

Uro cultivó: 100,000 UFC/ml de un solo germen

### TRATAMIENTO

- ❖ GENTAMICINA
- ❖ AMIKASINA
- ❖ CEFOTAXIMA

## CISTITIS

Infección de bacterias del tracto urinario bajo

- Urgencias
- Frecuencia
- Disuria
- Puria
- hematuria

Sin evidencia de afectación sistémica

Uro cultivó positivo mayor 100,000 UFC/ml

### TRATAMIENTO

- ♥ NITRIFURANTOINA
- ♥ AMOXICILINA
- ♥ FOSFOMICINA
- ♥ CEFALEXINA

## PREVENCIÓN DE LAS IVU

- ♣ IR AL BAÑO CUANDO LE DE GANAS.
- ♣ LIMPIEZA DE ADELANTE HACIA ATRÁS.
- ♣ BEBER MUCHOS LIQUIDOS.
- ♣ EVITAR ROPA MUY APRETADA.
- ♣ USAR ROPA INTERIOR DE ALGODÓN.
- ♣ ORINAR ANTES Y DESPUES DE LA ACTIVIDAD SEXUAL.

## FACTORES DE RIESGOS

- ♥ ACTIVIDAD SEXUAL
- ♥ EMBARAZO
- ♥ OBSTRUCCIÓN URINARIA
- ♥ DISFUNCIÓN NEURÓGENA
- ♥ REFLUJO VESICOURTERAL
- ♥ FACTORES GENÉTICOS