

MATERIA: patología del adulto

DOCENTE: doc. Marín López Martha patricia

Alumna: adaleni sanchez mejia

TRABAJO: cuadro comparativo

GRADO: 6 semestre

Hipotiroidismo.	Es una glándula pequeña con forma de mariposa ubicada en la parte delantera de la tráquea.	hipertiroidismo	El hipertiroidismo es la producción de demasiada hormona tiroxina. Puede aumentar el metabolismo.
Síntomas.	Todo el cuerpo: fatiga, letargo o sentir frío Desarrollo: crecimiento lento o pubertad tardía Pelo: caída del pelo o sequedad	Síntomas .	Ansiedad, dificultad para concentrarse, fatiga, deposiciones frecuentes, boca tiroides visiblemente agrandada o nódulos, tiroides, pérdida del cabello temblor de manos intolerar al calor.
Signos.	Fatiga., piel seca, aumento de peso , hinchazón en la cara, estreñimiento	Signos .	Pérdida de peso inesperada, ritmo cardíaco acelerado o irregular, irritabilidad y sudoración. Sin embargo, las personas de edad avanzada pueden no presentar
Diagnostico.	Se realiza sobre la base de los síntomas y los resultados de los análisis de sangre que miden el nivel de TSH y, a veces, el nivel de otra hormona tiroidea llamada tiroxina. Un nivel bajo de tiroxina y un nivel alto de TSH indican que la tiroides es hipoactiva	Diagnostico.	Análisis de sangre, prueba de captación de yodo radioactivo , gammagrafía de tiroides, ecografía de tiroides
Tratamiento.	El uso diario de la hormona tiroidea sintetica levotiroxina,levothroid,synthroid, y entre otros medicamentos.	Tratamiento.	Metizol,tapazolcirujia,levotiroxina,propranolol

Diabetes tipo 1.	Es una enfermedad de por vida (crónica) por la cual hay un alto nivel de azúcar (glucosa) en la sangre.	Diabetes tipo 2.	Es una enfermedad crónica que hasta no hace mucho solía producirse generalmente en adultos mayores de 50 -55 años por que se conocía como diabetes de adulto.
Síntomas .	fatiga, hambre, sed excesiva o sudoración : náusea o vómitos Urinarios: micción excesiva o mojar la cama También comunes: dolor de cabeza, frecuencia cardíaca rápida, pérdida de peso, somnolencia o visión borrosa	Síntomas.	Tener mucha sed Orinar frecuentemente Sentirse hambriento o cansado Perder peso sin proponérselo Tener heridas que sanan lentamente Visión borrosa
Signos.	Ansiedad de orinar a menudo, hambre extrema , irritabilidad y otros cambios de humor , fatiga y debilidad	Signos.	Parches de la piel oscura , picazón e infecciones micóticas, cicatrización lenta de cortadas y heridas, visión borrosa, sentir mucho cansancio , aumento de sed
Diagnostico.	Su nivel de glucemia en ayunas 7mmo superior en dos ocasiones, prueba de tolerancia a la glucosa oral ,examen de hemoglobina A1C A1C	Diagnostico.	Prueba de hemoglobina , examen aleatorio de azúcar en la sangre en ayunas ,prueba de tolerancia a la glucosa oral
Tratamiento.	Tomar insulina, realizar un proteínas recuento de hidratos de carbono , grasa y, controlar con frecuencia el azúcar en la sangre, hacer ejercicio en forma regular.	Tratamiento.	pérdida de peso, alimentación saludable, hacer ejercicio en forma regular, posiblemente ,medicamentos para la diabetes o tratamiento con insulina, control

