

**DOCENTE:**

**MARIN LOPEZ MARTHA PATRICIA**

**ALUMNA:**

**PEREZ AGUILAR MARIA ISABEL**

**MATERIA:**

**PATOLOGIA DEL ADULTO**

**TRABAJO:**

**CUADROS SINOPTICOS**

**SEMESTRE:**

**6°**

**GRUPO:**

**"A"**

**CAMPUS: FRONTERA COMALAPA CHIAPAS**

# HEPATITIS

Significa inflamación del hígado.

## TIPO A

### ETIOLOGIA

Son causados generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados u alcohol.

### FACTOR DE RIESGO

Se asocia a la falta de agua salubre y a las malas condiciones higiénicas y saneamiento.

### SIGNOS Y SINTOMAS

- Heces de color claro
- Orina oscura
- Somnolencia
- Fiebre
- Nausea
- Vomito
- Ictericia

### DIAGNOSTICO

Se establece mediante la detección de sangre de anticuerpos IgM dirigidos específicamente contra el VHA.

### TRATAMIENTO

Suele desaparecer sin necesidad de tratamiento el reposo y evitar el alcohol ayudara mucho.

# HEPATITIS

## TIPO B

### ETIOLOGIA

Es causada del contacto con la sangre, el semen u otros líquidos corporales de una persona infectada.

### FACTOR DE RIESGO

El riesgo aumenta si tiene relaciones sexuales sin protección, con alguien que tenga VHB, compartir agujas al consumir drogas.

### SIGNOS Y SINTOMAS


La hepatitis B generalmente no presenta síntomas. Cuando las personas tienen síntomas, son como los de la hepatitis A


### DIAGNOSTICO

Análisis de sangre.

### TRATAMIENTO

Depende del estado de gravedad del paciente la afección puede desaparecer por si sola, los caos crónicos requieren medicación o un trasplante de hígado.





## COLEALITIASIS

Es la formación de piedras (cálculos) en el interior la vesícula biliar.

### ETIOLOGIA

Se inicia con un defecto en la secreción de lípidos biliares que da lugar a una sobresaturación biliar de colesterol.

### FACTORES DE RIESGO

- ✓ Vesícula biliar
- ✓ sexo femenino
- ✓ Obesidad
- ✓ Quistes coledocales
- ✓ Anomalías de los conductos biliares

### SIGNOS Y SINTOMAS

La mayor parte de las veces no causan ningún síntoma, sin embargo si un cálculo biliar queda atrapado en un conducto dentro de la vesícula biliar puede causar: dolor abdominal intenso, dolor entre los hombros, náuseas y vomito.

### DIAGNOSTICO

- 1.- Exámenes de sangre para determinar los niveles de colesterol, bilirrubina y enzimas pancreáticas
- 2.- Ecografía abdominal y endoscopia como prueba visual de la presencia de cálculos

### TRATAMIENTO

Las personas que presentan síntomas generalmente necesitan cirugía y sin embargo los que no provocan síntomas no necesitan tratamiento.

# COLECISTITIS

Inflación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos y con menos frecuencia por barro biliar.

## ETIOLOGIA

Se produce a causa de partículas duras que se forman en la vesícula.

## FACTORES DE RIESGO

- ✓ Embarazo
- ✓ Ser mujer
- ✓ Terapia hormonal
- ✓ Edad avanzada
- ✓ Bajar o subir de peso rápidamente
- ✓ Diabetes.

## SIGNOS Y SINTOMAS

- 1.- Dolor intenso en la parte superior derecha o centro del abdomen.
- 2.- Dolor con la palpación del abdomen
- 3.- Nauseas
- 4.- vómitos
- 5.- Fiebre.

## DIAGNOSTICO

Se puede utilizar una ecografía abdominal, una ecografía endoscópica o una exploración por tomografía.

## TRATAMIENTO

Requiere de una estancia hospitalaria para controlar la inflamación se necesita tener ayuno, administración de líquido, antibióticos para combatir la infección, analgésicos y procedimiento para extraer cálculos.

# COLEDOCOLITIASIS



Hace referencia a la ocupación total o parcial del conducto (colédoco) por cálculos produciendo obstrucción del mismo.

## ETIOLOGIA

Se produce a causa de partículas duras que se forman en la vesícula.

## FACTORES DE RIESGO

Puede ocurrir en personas a quienes se les haya extirpado la vesícula biliar.

## SIGNOS Y SINTOMAS

- 1.- Dolor intenso en la parte superior derecha o centro del abdomen.
- 2.- coloración amarillenta de la piel o de la esclerótica de los ojos
- 3.- Nauseas
- 4.- vómitos
- 5.- Fiebre.
- 6.- Heces de color arcilla.


## DIAGNOSTICO

- 1.- Examen de bilirrubina
- 2.- pruebas de la función hepática
- 3.- enzimas pancreáticas.

## TRATAMIENTO

Cirugía para extirpar la vesícula y los cálculos





## INSUFICIENCIA RENAL CRONICA

Son riñones que están afectados y no pueden filtrar la sangre como debería.

### ETIOLOGIA

Las dos causas más comunes son la diabetes y la hipertensión

### FACTORES DE RIESGO

- problemas en las vías biliares presentes en el nacimiento
- Un paracito en el hígado
- Edad avanzada
- Tabaquismo

### SIGNOS Y SINTOMAS

No suele presentar síntomas en algunos casos, pero cuando se presenta síntomas significa que los riñones están muy dañados algunos de los síntomas sería:

- 1.- Comezón
- 2.- Calambres musculares
- 3.- Náuseas y vómitos
- 4.- No sentir hambre
- 5.- Hinchazón de los pies o tobillos
- 6.- Dificultad para respirar.

### DIAGNOSTICO

- 1.- Muestra de sangre de los niveles de creatinina y de urea o BUN

### TRATAMIENTO

Recibir el tratamiento de diálisis o un trasplante de riñón

## INSUFICIENCIA RENAL AGUDA



Es la pérdida súbita de la capacidad de los riñones para eliminar el exceso de líquido y electrolitos, así como el material de desecho de la sangre.

### ETIOLOGIA

Son las que se presentan cuando se producen un cuadro obstructivo que no permite la eliminación del filtrado, como ocurre cuando hay una obstrucción prostática o por compresión uretral por masas o ganglios.

### FACTORES DE RIESGO

- Ser de Edad avanzada
- Infección crónica
- Diabetes
- Hipertensión arterial
- Trastornos inmunológicos
- Problemas renales o hepáticos
- Obstrucción vesical.

### SIGNOS Y SINTOMAS

- 1.- Disminución de la producción de orina
- 2.- Falta de eliminación de los productos de desecho a través de la orina
- 3.- Retención de líquidos, provocando edemas en las piernas, tobillos y pies.
- 4.- Somnolencia, dificultad respiratoria.
- 5.- Fatiga

### DIAGNOSTICO

- 1.- Realizarse un análisis de sangre y orina, suele ser necesario realizar una ecografía abdominal e incluso una biopsia renal

### TRATAMIENTO

El tratamiento incluye ingesta de líquidos, uso de medicamentos y diálisis.

# PIELONEFRITIS

Es una infección urinaria, se define como la presencia de gérmenes en la orina

## ETIOLOGIA

Son las que se presentan cuando se producen un cuadro obstructivo que no permite la eliminación del filtrado, como ocurre cuando hay una obstrucción prostática o por compresión uretral por masas o ganglios.

## FACTORES DE RIESGO

- Infección en niños y reflujo vesico – renal
- Embarazo
- Diabetes
- Litiasis infecciosa
- Obstrucción

## SIGNOS Y SINTOMAS


- 1.- Picor y escozor miccional
- 2.- Aumento de la necesidad de miccionar
- 3.- Fiebre


## DIAGNOSTICO

- 1.- Se diagnostica mediante el cultivo de la orina en medios de crecimiento apropiados

## TRATAMIENTO

Antibiótico y Penicilina.





## INFECCION URINARIA

Son las infecciones bacterianas más frecuentes en la población anciana..

### ETIOLOGIA

Suelen ocurrir cuando ingresan bacterias en las vías urinarias a través de la uretra

### FACTORES DE RIESGO

- Anatomía femenina
- Actividad sexual
- Ciertos tipos de anticonceptivos
- Menopausia
- Anormalidades en las vías urinarias
- Obstrucción en las vías urinarias
- Uso de catéter

### SIGNOS Y SINTOMAS

- 1.- Necesidad imperiosa y constante de orinar
- 2.- Sensación de ardor al orinar
- 3.- Orinar frecuente en pequeñas cantidades
- 4.- Orina de aspecto turbio
- 5.- Orina con olor fuerte
- 6.- Dolor pélvico en las mujeres

### DIAGNOSTICO

- 1.- Cultivo de las bacterias de las vías urinarias en el laboratorio
- 2.- Análisis de Orina
- 3.- Creación de imágenes de las vías urinarias
- 4.- Uso de endoscopia para observar el interior de la vejiga.

### TRATAMIENTO

Trimetropima, sulfametoxazol, Fosfomicina, Nitrofurantoina, Ceftriaxona.

## CANCER VESICAL

Es una enfermedad por lo que se forman células cancerosas malignas en los tejidos de la vejiga. .

### ETIOLOGIA

Las causas de tabaquismo y otros consumos de tabaco. La exposición de sustancias químicas, infecciones parasitarias entre otros.

### FACTORES DE RIESGO

- Fumar
- Edad avanzada
- Ser de raza blanca
- Ser del sexo masculino
- Exposición a ciertas sustancias químicas
- Inflamación crónica de la vejiga
- Antecedentes personales o familiares de cáncer

### SIGNOS Y SINTOMAS

- 1.- Sangre en la orina
- 2.- Dolor al orinar
- 3.- Dolor pélvico
- 4.- Dolor de espalda
- 5.- Necesidad de orinar a menudo

### DIAGNOSTICO

- 1.- Cistoscopia
- 2.- Biopsia
- 3.- Citología de la orina
- 4.- Exploración por imágenes.

### TRATAMIENTO

Cirugía, Quimioterapia, Radioterapia, Inmunoterapia.



# HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA

Es una afección frecuente a medida que los hombres envejecen.

## ETIOLOGIA

Las causas podría deberse a cambios en el equilibrio de las hormonas sexuales a medida que los hombre envejecen. .

## FACTORES DE RIESGO

- Envejecimiento
- Antecedentes familiares
- Diabetes y enfermedad cardiaca
- Estilo de vida

## SIGNOS Y SINTOMAS

- 1.- Necesidad de orinar frecuentemente
- 2.- Aumento de la frecuencia de la orina por la noche
- 3.- Dificultad para comenzar a orinar
- 4.- Flujo de orina débil o que se detiene y vuelve a comenzar
- 5.- Goteo después de orinar
- 6.- Sangre en la orina

## DIAGNOSTICO

- 1.- Tacto rectal
- 2.- Análisis de orina
- 3.- Análisis de sangre
- 4.- Prueba de flujo urinario
- 5.- Ecografía transrectal
- 6.- Biopsia de la próstata

## TRATAMIENTO

Alfabloqueantes, Inhibidores de 5- alfa reductasa, terapia con combinación de medicamentos.

