

DRA: MARTHA PATRICIA MARIN.

PRESENTA EL ESTUDIANTE:

HERRERA VAZQUEZ DANIA YULISA.

GRUPO, SEMESTRE Y MODALIDAD:

6TO. CUATRIMESTRE "A" LIC. ENFERMERIA.

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.

7 DE JULIO DEL 2020.

PATOLOGIAS DIGESTIVAS

Son

trastornos del aparato digestivo, que algunas veces se denomina tracto gastrointestinal.

Se divide

En

Gastroenteritis

en

Gastritis

en

Úlcera péptica

Es

Inflamación de la mucosa del estómago y del intestino.

es

La inflamación del revestimiento del estómago

es

Una llaga situada en la pared interna del estómago o del intestino delgado superior

La

pérdida de apetito y las náuseas, seguidas de diarrea, son los primeros síntomas de esta enfermedad.

tiene

Fase aguda

Fase crónica

Que dura solo un poco tiempo.

Puede durar años.

Síntomas

Dolor o ardor (indigestión) en la parte superior del abdomen; pueden mejorar o empeorar cuando comes.
Náuseas.
Vómitos.
Sensación de saciedad en la parte superior del abdomen luego de haber comido.

Síntomas

Náuseas.
Vómitos.
Heces negras, alquitranosas o con sangre.
Dolor torácico.
Fatiga.
Vómitos, posiblemente con sangre.
Pérdida de peso.

PROBLEMAS ESOFÁGICOS

Son

La

y

Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Cáncer de esófago.

Es

Es

el paso del contenido gástrico al esófago de forma espontánea.

Cáncer del conducto que se extiende desde la garganta hasta el estómago

Tipos

Tiene

Síntomas

Carcinoma de células escamosas.

Adenocarcinoma.

Síntomas: acidez, dolor en el pecho, jadeos, dolor de garganta y afonías.

Diagnóstico: Si los síntomas del reflujo gastroesofágico del paciente no mejoran el médico puede ordenar que se le realice una endoscopia gastrointestinal y biopsia

- Dificultad para tragar (disfagia)
- Adelgazamiento sin proponérselo.
- Dolor, presión o ardor en el pecho.
- Ardor de estómago o indigestión que empeoran.
- Tos o ronquera.

En

Este tipo de cáncer puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo del esófago.

En

Este tipo de cáncer ocurre generalmente en la parte distal del esófago

Con

El tratamiento depende de la etapa: El tratamiento consiste en eliminar el cáncer mediante cirugía. La quimioterapia y la radioterapia también pueden utilizarse.

PROBLEMAS GÁSTRICOS

Son anomalías en el interior o el exterior de los intestinos su intensidad varía desde las que producen síntomas leves sin ninguna complicación a largo plazo

La

Son

Gastritis.

diagnóstico

Después de haber hablado contigo sobre tu historia clínica y de realizarte un examen, quizás también tengas que hacerte un análisis para determinar la causa exacta.

y

Pruebas para el H. pylori.
Radiografía del aparato digestivo superior

Es

Una enfermedad estomacal y digestiva, que consiste en la inflamación de la membrana que recubre el estómago

Tipos

Gastritis aguda

Gastritis crónica

Es

Producida por infecciones virales, bacterianas o parasitarias, incluso por el consumo de determinados medicamentos.

Es

Causada por determinantes infecciones o por el consumo excesivo de alcohol y tabaco.

Síntomas

- Dolor o ardor (indigestión) en la parte superior del abdomen; pueden mejorar o empeorar cuando comes.
- Náuseas.
- Vómitos.
- Sensación de saciedad en la parte superior del abdomen luego de haber comido.

Síntomas

- Dolor abdominal.
- Náuseas y vómitos.
- Acidez de estómago.
- Fatiga.
- Ausencia de hambre o inapetencia, que en ocasiones puede producir pérdida de peso.

PROBLEMAS GASTRICOS

Úlcera gástrica

causa clásicamente dolor quemante o retortijones, con frecuencia de aparición nocturna, que se alivian de manera rápida con la ingestión de alimento o antiácidos

Tiene

Síntomas

Son

- Dolor y ardor de estómago
- Sentirte saciado, hinchado, y eructar
- Intolerancia a las comidas grasosas
- Ardor de estómago
- Náuseas

Signos de alarma

Son

- Pérdida de peso.
- Anemia.
- Hemorragia.

Diagnostico

Por medio de una endoscopia

Tratamiento

este

incluye medicamentos para disminuir la producción de ácido estomacal. Si una bacteria es la causa, es posible que se necesiten antibióticos.

Son

- Antibióticos para eliminar el *Helicobacter pylori*.
- Medicamentos que bloquean la producción de ácido y promueven la curación.
- Medicamentos para disminuir la producción de ácido.
- Antiácidos que neutralizan el ácido estomacal.

PROBLEMAS GÁSTRICOS

Cáncer de estómago

Este

Aparece como consecuencia de una proliferación anormal de células en cualquier parte del estómago

Síntomas

Son

- Molestias abdominales en la zona del estómago
- Náuseas
- Vómitos
- Malestar general
- Pérdida de peso

Signos de alarma

son

- Poco apetito.
- Malestar impreciso en el abdomen, generalmente justo encima del ombligo.
- Sensación de llenura en el abdomen superior después de comer una comida liviana.
- Acidez (agruras) o indigestión.
- Vómito, con o sin sangre.

Diagnostico

son

- Biopsia
- Prueba molecular de pulmón
- Endoscopia

Tratamiento

son

- Cirugía para el cáncer de estómago.
- Quimioterapia para el cáncer de estómago.
- Terapia dirigida contra el cáncer de estómago.
- Inmunoterapia para el cáncer estómago.
- Radioterapia para el cáncer de estómago.

PROBLEMAS DEL TRACTO INTESTINAL.

Colitis ulcerosa

suele afectar al revestimiento interno del intestino grueso (colon) y al recto. Hay diferentes variedades, desde moderada hasta grave.

Esto

Síntomas

Son

- Dolor y cólicos abdominales.
- Dolor en el recto.
- Necesidad urgente de defecar.
- Incapacidad para defecar a pesar de la urgencia.
- Adelgazamiento.
- Fatiga.

Signos de alarma

son

- Diarrea, que suele tener sangre o pus.
- Dolor en el recto.
- Sangrado rectal (evacuar heces con una pequeña cantidad de sangre)
- Incapacidad para defecar a pesar de la urgencia.

Diagnostico

son

- Análisis
- Muestra de heces
- Colonoscopia
- Radiografías
- Tomografías computarizadas

Tratamiento

El cual

Consiste en medicamentos antiinflamatorios.

PROBLEMAS DEL TRACTO INTESTINAL.

Cáncer de colon

Esto

se desarrollan a partir de adenomas de colon previos, y el cáncer colorrectal se puede evitar en su mayor parte detectando y resecaando los pólipos adenomatosos del colon.

Síntomas

Son

- Un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluidos diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces
- Molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor
- Una sensación de que el intestino no se vacía por completo
- Debilidad o fatiga
- Pérdida de peso sin causa aparente

Signos de alarma

es

Sangrado rectal o sangre en las heces.

Diagnostico

son

- Colonoscopia
- Análisis de sangre

Tratamiento

El tratamiento del cáncer colorrectal depende del tamaño, la ubicación y la extensión del cáncer. Los tratamientos más comunes incluyen la cirugía para extraer el cáncer, la quimioterapia y la radioterapia.

PROBLEMAS DEL TRACTO INTESTINAL

Ostomias

Es

una exteriorización del intestino en la pared del abdomen realizada con el objetivo de poder evacuar las heces debido a un problema médico que impida eliminarlas por el ano.

Síntomas

- Nota un cambio en el tamaño o color de la estoma, especialmente si se vuelve rojo, púrpura, negro o blanco.
- Tiene heces sanguinolentas o hay sangrado en la estoma.
- Tiene dolor abdominal, náuseas o vómitos.
- Tiene irritación o la piel que rodea la ostomía está roja.
- No pasan las heces.

Diagnostico

Este

En ciertas ocasiones y dependiendo de la complejidad de la enfermedad y de la intervención, el cirujano decide realizar una estoma

Tratamiento

Es

A la estoma se fija una bolsa para recolectar los gases y las heces que pueden ser líquidas, pastosas o formadas

PROBLEMAS ABDOMINALES

Enfermedad diverticular.

La causa de la diverticulosis y la diverticulitis no se conoce con precisión, pero es más común en las personas que consumen una dieta baja en fibra.

Síntomas

son

- Dolor, que puede ser constante y persistente durante varios días.
- Náuseas y vómitos.
- Fiebre.
- Sensibilidad abdominal.
- Estreñimiento o, con menos frecuencia, diarrea.

Tratamiento

es

El tratamiento consiste en cambios en la dieta.

Generalmente no se necesita tratamiento, a menos que haya inflamación (diverticulitis).

Esto

es un problema común que afecta a personas de 60 años de edad y a casi todos de 80 años

PROBLEMAS ABDOMINALES

Apendicitis aguda

Es

Afección dolorosa en la que el apéndice se inflama y se llena de pus.

Síntomas

Son

- Escalofríos
- Fiebre
- Malestar
- pérdida de apetito
- diarrea
- nauseas
- vomito

Signos de alarma

es

Áreas de dolor:
abdomen, abdomen
inferior derecho o mitad
del abdomen

Tratamiento

Este

Tratamiento consiste
en cirugía

La apendicitis suele
tratarse con cirugía y
antibióticos. Si no se
trata, el apéndice
puede reventarse y
causar un absceso o
una infección
sistémica (sepsis).

PROBLEMAS ABDOMINALES

Hernias

es

Un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal (peritoneo).

tipos

Hernia femoral

Hernia hiatal

Hernia quirúrgica

Hernia umbilical

Hernia inguinal

es

esta

esta

es

es

Una protuberancia en la parte superior del muslo, justo debajo de la ingle.

se presenta en la parte superior del estómago.

puede darse a través de una cicatriz.

una protuberancia alrededor del ombligo.

una protuberancia en la ingle.

Síntomas

- Náuseas, vómitos o ambos.
- Fiebre.
- Dolor repentino que se intensifica rápidamente.

Signos de alarma

- Un bulto de la hernia que se pone rojo, violáceo o de color oscuro.
- Incapacidad para evacuar el intestino o eliminar gases.

Tratamiento

El tratamiento consiste en cuidados de apoyo

El tratamiento incluye chequeos médicos para control. Si es necesario, una cirugía puede volver el tejido a su ubicación normal y cerrar la apertura.

PROBLEMAS DE RECTO Y ANO

Hemorroides

Las hemorroides sintomáticas afectan en el mundo occidental cada año a más de un millón de personas.

Síntomas

Son

- Picazón o irritación en la zona anal.
- Dolor o molestia.
- Hinchazón alrededor del ano.
- Sangrado.

Signos de alarma

es

Sangrado abundante

Tratamiento

Es

El tratamiento de las hemorroides sangrantes se basa en el estadio de la enfermedad (cuadro 279-4). En toda persona que sangra hay que pensar en otras causas posibles.

PROBLEMAS DE RECTO Y ANO

Fisura anal

Fistula anal

Es

Un pequeño desgarro en el tejido delgado y húmedo (mucosa) que recubre el ano.

El tratamiento quirúrgico comprende la dilatación anal y la esfinterotomía interna

un conducto infectado entre la piel y el ano, la apertura muscular en el extremo del tracto digestivo.

síntomas

tratamiento

Síntomas

tratamiento

- Dolor intenso.
- Estreñimiento.
- Sangrado.

Se recomienda la realización de baños de asiento con agua templada durante 10-15 minutos después de cada deposición.

Secreción o sangrado

Generalmente, se necesita cirugía para tratar la fístula anal.