

CUADRO COMPARATIVO

PATOLOGIA DEL ADULTO
DRA. CINDY DE LOS SANTOS CANDELARIA

PRESENTA LA ALUMNA:


Geni Azereth García López

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

6to. Cuatrimestre “B” Lic. En Enfermería

Frontera Comalapa, Chiapas.

25 de julio del 2020

<p style="text-align: center;">DIFERENCIAS</p> 	<p style="text-align: center;">ARTRITIS REUMATOIDE</p> 	<p style="text-align: center;">ARTROSIS</p> 
<p>DEFINICION</p>	<p>Es una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune, caracterizada por una inflamación persistente de las articulaciones.</p>	<p>Es el desgaste de los tejidos protectores en los extremos de los huesos (cartílagos) se produce gradualmente y empeora con el tiempo.</p>
<p>CAUSAS</p>	<p>Infección provocada por hongos, virus, exceso de peso y fallo del sistema inmunológico.</p>	<p>Exceso de trabajo repetitivo, obesidad, edad. Traumatismos, genero y lesiones en las articulaciones.</p>
<p>LESION</p>	<p>Membrana sinovial</p>	<p>Cartílago</p>
<p>EPIDEMIOLOGIA</p>	<p>Poliartritis más común inflamatoria en adultos Prevalencia en países desarrollados Deformidades mas notorias en raza blanca 30 a 50 años de edad</p>	<p>Mas frecuente en países occidentales. Se pierden proteoglucanos por la edad, 55 años artrosis común en varones y en la menopausia por la falta de estrógeno es más común en la mujer.</p>
<p>SIGNOS Y SINTOMAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor • Limitación articular • Rigidez articular matutina de 30 min • Crujidos articulares • Deformante asimétrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor • Rigidez matutina de 1 hr • Deformante simétrica y astenia

SIGNOS VISIBLES MAS COMUNES	<ul style="list-style-type: none"> • Nódulo reumatoide en la zona de rozamiento (habitualmente duro en los codos, el dorso de los dedos de la mano y pies) • Sequedad de la piel y la mucosa 	<ul style="list-style-type: none"> • Estrechamiento del espacio articular asociada a esclerosis subcondral • Aparición de osteofitos marginales (prominencias Oseas) • Quistes y anomalías del contorno óseo
LOCALIZACION MAS FRECUENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Muñecas • Dedos de las manos y pies • Codos • Hombros • Caderas • Rodillas • tobillos 	<ul style="list-style-type: none"> • Columna cervical • Columna lumbar • Hombros • Dedos de las manos • Base del pulgar • Cadera • rodilla
DIAGNOSTICO	Se diagnostica radiológicamente, escala de keligrenlawrence, gamagrafia	Se diagnostica por pruebas serológicas como criterios de laboratorio, anticuerpos anti-citrulina, elevación de la sedimentación sanguínea .
TRATAMIENTO	Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (metotrexato, leflunomida, sales de oro, etc..).	Analgésicos antiinflamatorios