

(COLECISTITIS Y COLELITIASIS)

(PATOLOGIA DEL ADULTO)

(DRA. CINDY DE LOS SANTOS CONDELARIA)

PRESENTA EL ALUMNO:

(KEGNER NEYSO VILLATORO PEREZ)

GRADO Y GRUPO, MODALIDAD:

(6to CUATRIMESTRE "B" SEMIESCOLARIZADO)

Lugar y fecha:

FRONTERA COMALA CHIAPAS DEL 04 DE JULIO DE 2020

Colecistitis y colelitiasis

Definición

- ✚ Inflamación de la vesícula biliar
- ✚ Ocasionada principalmente por cálculos (lito)
- ✚ Principales causas de consulta en urgencias
- ✚ Intervención quirúrgica más frecuente

Estilo de vida

- ✓ El ejercicio físico
- ✓ Alimentación sana
- ✓ Control de obesidad

✓ Uso adecuado de hormonas en:

- ✚ Como método anticonceptivo
- ✚ climaterio

Factor de riesgo

- Sexo femenino
- Embarazo
- Anticonceptivos orales y terapia hormonal
- Otros fármacos como los fibratos y la ceftriaxona
- Antecedentes familiares de litiasis biliar
- Obesidad
- Nutrición parenteral
- Diabetes mellitus
- Cirrosis hepática
- Enfermedades del íleon
- Enfermedad de Crohn
- Dislipidemia
- Enfermedades hepáticas y metabólicas
- Mayor de 40 años

Clasificación

- Grado 1 { Leve
 - ✓ Un paciente saludable sin disfunción orgánica
 - ✓ Cambios inflamatorios leves en vesícula biliar
 - ✓ Colecistectomía se puede hacer de forma segura con bajo riesgo operatorio
- Grado 2 { Moderado
 - Conteo de leucocitos elevados ($\geq 18,000$ mm³)
 - Masa palpable en cuadrante superior derecho de abdomen
 - Duración del cuadro clínico ≥ 72 horas
 - Marcada inflamación local (peritonitis biliar, absceso peri vascular, absceso hepático, colecistitis gangrenada, colecistitis enfisematosa)
- Grado 3 { Grave
 - ✚ Disfunción cardiovascular (hipotensión que requiere con dopamina ≥ 5 ug/kg/min. O cualquier dosis de dobutamina).
 - ✚ Disfunción neurológica (disminución del nivel de conciencia)
 - ✚ Disfunción renal (oliguria, creatina ≥ 2.0 mg/dl).
 - ✚ Disfunción hematológica (plaquetas $\leq 100,000$ /mm³).
 - ✚ Disminución hepática (TP-INR ≥ 1.5).
 - ✚ Disfunción respiratoria (PaO₂/FiO₂ promedio ≤ 300).

