

Preguntas de foro

Morfología y función

Profesor: Dra. Martha Patricia Marin López

Presenta el alumna: Beatriz Lourdes Velázquez González

Semestre, grupo y modalidad

3er. Cuatrimestre "D" Lic. En enfermería

Frontera Comalapa Chiapas a 24 de mayo del 2020

1.- Paciente femenino de 6 años de edad acude con retraso cognitivo, soplo sistólico, estatura corta, cabeza redonda, orejas pequeñas y epicanto interno. Además, se observa en ambas palmas pliegues palmar único. El diagnóstico más probable:

- a) Trisomía 18
- b) Síndrome de Turner
- c) Síndrome de Ehlers Danlos
- d) Trisomía 21

2.-Paciente de 18 años de edad, G3 P2, con embarazo de 22 SDG por FUM, la cual acude a su cita de control prenatal con USG de dos días previos el cual reporta anhidramnio

¿Cuál es el órgano fetal de mayor importancia en la producción de líquido amniótico en el tercer trimestre y por la cual si presenta una mujer disminución de líquido amniótico (oligohidramnio) se debe sospechar de malformaciones del mismo? Si en la manera en el que el bebe pueda desarrollarse y puede causar muchas complicaciones en el embarazo

- a) Piel
- b) Pulmones
- c) Riñones
- d) Aparato digestivo

3.- Atiende embarazada en sala de ultrasonido en el ámbito privado, la doctora le pregunta la relación vena: arteria de cordón umbilical, que mencione porqué es importante y con que trisomía se relaciona más, por lo que usted contesta.

RELACION: a) 1:1 b) 2:3 c)3:1 d) 2:1

Trisomía: a) 21 b)13 c)18 d)15

Porque es importante respuesta libre: las venas y las arterias son muy importantes ya que, la vena que contiene el cordón umbilical transporta oxígeno y nutrientes desde la placenta asta el bebé, y las otras dos arterias devuelven los productos de desecho del bebé a la placenta. Luego la placenta transfere estos desechos a la sangre de la madre, que se encarga de eliminarlos.

Si detectamos en una interpretación de ultrasonido, una anomalía umbilical única por ultrasonido entre las 22 a 26 SDG, recomendaríamos a la madre realizar: a) otro ultrasonido b) cariotipo c) continuar control prenatal no tiene de que preocuparse. D) ultrasonido con perfil biofísico

4.- ¿Se encuentra dando de alta a mujer en el puerperio, acaba de tener su primer bebe y le pide asesoría sobre el cordón umbilical ¿Qué tiempo es normal para que se caiga? El tiempo normal del cordón umbilical en desprenderse es de ocho a diez días.

Manejo del cordón umbilical que debe darle en casa para su cuidado: primero sería en desinfectar las manos luego quitar la gasa y con agua tibia y jabón se limpiaría la zona del cordón umbilical hasta que quede limpio y luego mantenerlo seco la zona y poner una gasa limpia y seca para envolver el cordón

Cuando acudir a un centro de salud: cuando el cordón umbilical empieza a sangrar excesivamente puede que tenga una infección bacteriana por no tener buena higiene

5.- Acude con al centro de salud adolescente, acaba de contraer matrimonio recientemente, su duda es si debería tomar ácido fólico, ya que su esposo desea tener un niño lo más pronto posible, entonces necesita su asesoría por usted. Debe de tomar antes el ácido fólico y durante el embarazo para que la mujer pueda y tenga las vitaminas y que requiera su cuerpo para poder dar vida a otro individuo

Según la norma oficial mexicana y guía de práctica clínica de control prenatal ¿cuándo es el momento que se recomienda la toma de ácido fólico

A) inmediatamente salga prueba de orina positiva b) 1 mes antes de concepción y 2 primeros meses C) 3 meses antes de concepción y primeras 13 semanas de gestación D) cuando ella quiera iniciarlo está bien

Cuanto es lo recomendable tomar diario si la paciente no tiene antecedentes de defectos del tubo neural: a) 4 mg d) 400 microgramos b) 5gr d) 3mg

6.- Paciente con labio y paladar hendido de 23 años, recientemente acude para asesoría por enfermería de cuanto de ácido fólico le corresponde:

a) 5 mg d) 400 microgramos b) 5gr d) 3mg

7.-Cuanto en % disminuye los defectos del tubo neural el uso de ácido fólico según guía de práctica clínica control prenatal para los dos escenarios antes mencionados, mujer sana sin antecedentes de defectos del tubo neural y mujeres con antecedentes de defectos de tubo neural.

Se dice que disminuye el 69% los defectos del tubo neuronal según la guía de práctica clínica.

8.-Acude mujer embarazada a control prenatal y le menciona que quiere hacer una piñata con confeti del color azul o rosa según el sexo de su bebe, para sorprender a su esposo. Sin embargo dice es de bajos recursos. ¿Cuándo le recomienda hacerse el ultrasonido?

A) 5to mes b) 6to mes c)4to mes d) 7to

9.- Acude paciente femenina de 21 años. Primigesta. Embarazo de 26.2 SDG. Asintomática. Acude a consulta por presentar t/a 150/100 mmHg. Sin alteración en sus laboratoriales a excepción de 314 mg de proteínas en orina, dando diagnóstico de preeclampsia leve. Según las teorías causales de esta enfermedad, se inicia desde la gestación en la formación de la circulación materno-fetal que está dada por:

A)trofoblasto b)corio c)amnios d)alantoides