



Viviana Edith Rojas Torres

Fisipatologia

Mapa sinoptico

2° semestre

Patrones y manifestaciones clínicas de la fiebre

patrones

- Fiebre intermitente { la que la temperatura recupera la normalidad por lo menos una vez cada 24 h
- Fiebre remitente { la temperatura no regresa a la normalidad y varía unos cuantos grados en cualquier dirección
- Fiebre sostenida { temperatura permanece por encima del valor normal con variaciones mínimas (por lo general menores de 0,55 °C)
- Fiebre recurrente { se presentan uno o más episodios de fiebre, cada uno con duración hasta de varios días, con períodos de uno o más días con temperatura normal entre los episodios

Manifestaciones clínicas

- 4 fases
1. Una fase prodrómica. { molestias inespecíficas, como cefalea leve y fatiga, malestar general y dolorimientos fugaces y dolores
 2. Una fase de escalofríos, durante la cual se incrementa la temperatura. { escalofríos, existe una sensación incómoda de tener frío e inicia un temblor generalizado (estremecimiento), aunque la temperatura va en incremento. La vasoconstricción y la piloerección se hacen presente también
 3. Una fase de rubicundez. { se presenta vasodilatación cutánea y la piel se mantiene caliente y rubicunda
 4. Una fase de defervescencia { la respuesta febril está señalada por el inicio de la diaforesis

Manifestaciones frecuentes

- anorexia, mialgias, artralgias, fatiga
- temperatura 39,5 °C. (respiración aumenta y la frecuencia cardíaca suele elevarse. Se presenta deshidratación por efecto de la sudoración)
- temperatura excede los 40 °C. (delirio)

biografia

Porth, S. G. (2014). *Fisiopatologia* . Barcelona: Wolters Kluwer Health.