



Universidad del Sureste Escuela de Medicina

Grado.3 Grupo. A

Crecimiento y desarrollo




Cuadro (método de capurro)

DR. Cancino Gordillo Gerardo

Alumno – Carlos Alexis Espinosa Utrilla





25/10/20

Test de Capurro (es un criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato)

	0	5	10	15	20
Forma de la Oreja	 Chala. Pabellón no incurvado	 Pabellón parcialmente incurvado en el borde	 Todo el borde sup incurvado	 Pabellón totalmente incurvado	☺ UPS
Tamaño de glándula mamaria	 No palpable	 Palpable menor de 5 mm	 Palpable entre 5 y 10 mm	 Palpable mayor de 10 mm	
Textura de la piel	Muy fina gelatinosa	Fina lisa	Muy gruesa, descamación superficial discreta	Gruesa, grietas, superficies descamación en manos y pies	Gruesa, grietas profundas aparغام-nedós
Formación del Pezón	Apenas visible sin areola	Diametro menor de 7.5 mm, areola lisa y chata	Diametro mayor de 7.5 mm areola puntuda, borde no levantado	Diametro mayor de 7.5 mm areola - puntuda, borde levantado	
Pliegues Plantares.	 5m pliegues	 marcas mal definidas en 1/2 anterior	 marcas bien definidas en 1/2 anterior surcos en 1/3 anterior	 Surcos en la 1/2 anterior	 Surcos en más de la 1/2 anterior
Formula de edad gestacional	<p>Rangos de edad</p> <p>Postmaturo - 42 semanas o más</p> <p>A término - entre 37-41 Seman</p> <p>Prematuro leve - 35-36 Sm</p> <p>Prematuro moderado - 32-34 Sm</p> <p>Prematuro extremo - 32 semanas</p>		objetivo	Principios	Para lograr la acción ↓
	$E = \frac{204 + P}{7}$		- Determinar la edad gestacional de un recién nacido	- el manejo del cuerpo del RN debe ser suave y firme	<p>Para evitar factores adicionales</p> <p>- el lavado de manos garantiza la ausencia de infecciones por M.O patógenos.</p>

Test de Capurro (es un criterio utilizado para estimo)

Forma de la Oreja	 <p>Chata. Pabellón no incurvado</p> <p>D</p>	 <p>Pabellón parcialmente incurvado en el borde</p> <p>B</p>
Tamaño de glándula mamaria	 <p>No palpable</p>	 <p>Palpable menor de 5 mm</p>
Textura de la piel	Muy fina gelatinosa	Fina lisa
Formación del Pezón	Apenas visible sin areola	Diametro menor de 7.5 mm; areola lisa y chata
Pieques Plantares.	5m pliegues	marcas mal definidas en 1/2 anterior
Formula de edad gestacional	<p>Rangos de edad</p> <p>Postmaduro - 42 semanas o mas</p> <p>A termino - entre 37-41 Seman</p> <p>Prematuro leve - 35-36 Sm</p> <p>Prematuro moderado - 32-34 Sm</p> <p>Prematuro extremo - 32 semanas</p>	
	$E = \frac{204 + P}{7}$	

Comparar la edad gestacional de un neonato)		UDS
 <p>todo el borde sup incurvado 16</p>	 <p>pabellón totalmente incurvado 14</p>	☺
 <p>Palpable entre 5 y 10mm 10</p>	 <p>Palpable mayor de 10mm 15</p>	
<p>may gruesa, descamación superficial discreta 10</p>	<p>gruesa, grietas, superficiales, descamación en manos y pies 15</p>	<p>gruesa, grietas profundas, aparlamadas 20</p>
<p>Diámetro mayor de 7.5 mm areola Puntuada, borde no levantado 10</p> 	<p>Diámetro mayor de 7.5 mm areola Punteado, borde levantado 15</p> 	
<p>marcas bien definidas en 1/2 anterior Sulcos en 1/3 anterior 10</p> 	<p>Sulcos en la 1/2 anterior 15</p> 	<p>Sulcos en más de la 1/2 anterior 20</p> 
<p>objetivo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determinar la edad gestacional de un recién nacido 	<p>principios para lograr la acción ↓</p> <ul style="list-style-type: none"> - el manejo del cuerpo del RN debe ser suave y firme 	<p>para evitar patologías adicionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - el lavado de manos garantiza la ausencia de infecciones por microorganismos.

FUENTES

Ventura Laveriano, W. R. (2015). Validez de la evaluación posnatal de la edad gestacional: estudio comparativo del método de Capurro versus ecografía de las 10+ 0 a 14+ 2 semanas. *Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia*, 61(2), 115-120