

Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Crecimiento y desarrollo.

Trabajo:

Resumen:

CAPURRO.

Docente:

Dr. Gerardo Cancino Gordillo.

Alumno:

Casto Henri Méndez Méndez

Semestre y grupo:











3 ° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 25 de octubre de 2020.

El test de capurro.

El test de capurro o método de capurro es un criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato. El test considera el desarrollo de cinco parámetros fisiológicos y diversas puntuaciones que combinados dan la estimación buscada. La valoración puede determinar cinco intervalos básicos para la edad gestacional.

Capurro "A"

Textura de la piel (T.P)	0 Muy fina gelatinosa	5 Fina y lisa	10 Más gruesa discreta descamación superficial.	15 Gruesa con grietas superficiales descamación pies y manos	20 Gruesas grietas profundas agrietados.
Forma de la Oreja (T.O)	10 Aplanado sin forma 	18 Incurvación de una parte de borde del pabellón 	16 Incurvación en el borde superior. 	24 Pabellón totalmente incurvado. 	
Tamaño de la glándula mamaria (T.G.M)	10 No palpable	5 Palpable < 5mm. 	10 Diámetro entre 5-10mm. 	15 > 10mm 	17 
Pliegos plantares	5 Sin pliegues. 	13 Pliegues mal definidos sobre la mitad anterior. 	10 Pliegues bien definidos sobre la 1/2 anterior y surcos en la ant. 	15 Surcos en la mitad anterior. 	20 Surcos en más de la mitad anterior. 
Maniobra de la bufanda	10 	16 	12 	18 	
Posición de la cabeza	0 	4 	8 	12 	

1.- Si la valoración entre dos cifras tomar el promedio.

2.- Añádase a la suma total de 200 y se obtiene en día la edad gestacional.

Formula:

$$Ese = 200 + TP + FO + TGM + PP + MB + PC.$$

3.- Rango entre 208 y 302 días.

Aplicación de la escala de capurro ,

Después de tener claro los parámetros, se debe medir cada uno de ellos y luego sumar los resultados .

Categorías.

+ Post-maduro → 42 semanas o más

* A término → 37 - 41 Semanas

* Prematuro leve → 35 - 36 Semanas.

* Prematuro moderado → 32 - 34 Semanas.

* Prematuro extremo → Menos de 32 Semanas

Bibliografías

- Pediatría de Martínez, 8va edición. unidad 6 neonatología, paginas 15
- <https://www.ameemcti.com/post/escala-de-valoraci%C3%B3n-del-reci%C3%A9n-nacido-actualizado>
- <http://medicinamnemotecnias.blogspot.com/2015/01/metodo-de-capurro.html>
- <https://psicocode.com/desarrollo/test-capurro/>