



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Nombre de alumno:
Gordillo López Eric Roberto

Nombre del profesor:
CANCINO GORDILLO GERARDO

Nombre del trabajo:
CUADRO

Materia:

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Grado: 3 Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 septiembre de 2020.

REFLEJO	EXPLORACIÓN	EDAD	POSIBLES PATOLOGÍAS	IMAGEN
reflejo tónico del cuello	se produce cuando la cabeza de un niño relajado en posición supina (boca arriba) se rota hacia un lado.	6 o 7 meses	la coordinación mano-ojo – dificultades como la capacidad de controlar la mano y el brazo al escribir	
Incurvación del tronco o reflejo de galant	Se acaricia o da golpecitos a lo largo del lado de la columna mientras el bebé permanece boca abajo. el bebé girará sus caderas hacia donde lo tocan en un movimiento "danzante".	Nacimiento - 4 o 5 meses	El niño puede experimentar hipersensibilidad en la espalda, lo que hará que no soporte las ropas muy ajustadas.	
Reflejo de búsqueda	Se toca mejilla, gira cabeza para buscar pezón.	3-9 meses	Reflejo de hociqueo, daño en el lóbulo frontal.	
Reflejo de moro	Ruido fuerte o soltar al bebé, agita los brazos, arquea la espalda y busca protección.	3-6 meses	Retracción cefálica, lesiones corticoespinales, esclerosis lateral.	
Reflejo de prensión	pone un dedo en la palma de la mano abierta del bebé. La mano se cerrará alrededor del dedo. El intento de retirar el dedo hace que el agarre se apriete.	5 o 6 meses	anomalías en el desarrollo motriz.	

REFLEJO	EXPLORACIÓN	EDAD	POSIBLES PATOLOGÍAS	IMAGEN
Reflejo de marcha automática	se sujeta al bebé por las axilas y se le sitúa sobre un plano recto, éste a partir del estímulo en la planta de los pies flexiona o estira sus piernas alternativamente como si quisiera caminar	2 meses	anomalías en el desarrollo motriz.	
Reflejo de Babinski	Cuando se le pasa suavemente la mano por la planta del pie desde el talón hasta el dedo gordo, levanta los dedos y voltea el pie hacia adentro.	6 MESES y 2 AÑOS	Esclerosis lateral amiotrófica Lesión o tumor cerebral Meningitis	
REFLEJO ÓPTICO FACIAL	Parpadeo al aproximar al ojo un objeto.	4 meses	ceguera cortical o encefalopatía	
REFLEJO DE PARACAÍDAS	Se inclina lateralmente al lactante, en ambas direcciones, debe poner la mano	6 -7 mes y no desaparece en toda la vida.	Útil para detectar asimetrías	

Bibliografía

- Examen Neurológico del Lactante JuanJoséGarcíaPeñas Servicio de Neuropediatría Hospital Niño Jesús Madrid III Jornada de actualización en Pediatría de Atención Primaria de la SPAPex
- Exploración neurológica en la infancia temprana VI Reunión APAPCYL.
- Desarrollo psicomotor del niño y su valoración en atención primaria Psychomotor development of the child and its evaluation in primary care
- Iceta1, M.E. Yoldi2