

Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Crecimiento y Desarrollo

Trabajo:

REALIZA UN CUADRO EN EL QUE EJEMPLIFIQUES CON
IMAGENES Y ADEMÁS REALIZES UNA DESCRIPCIÓN DE COMO
SE EXPLORAN LOS REFLEJOS PRIMITIVOS EN EL RECIEN
NACIDO, HASTA QUE EDAD ES NORMAL ENCONTRARLOS Y EN
QUE PATOLOGÍAS DEBEMOS SOSPECHAR SI LOS
ENCONTRAMOS EN EDADES POSTERIORES. DEBERÁN IR EN
ORDEN DEL DE MAYOR RELEVANCIA CLÍNICA AL DE MENOR.

Docente:

Dr. Cancino Gordillo Gerardo

Alumno:


Gordillo López José Luis

Semestre y grupo:


3º "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 22 de Septiembre del 2020.

REFLEJO	EDAD O DURACION	EXPLICACION	IMAGEN
REFLEJO DE BABKIN	1 MES.	Ocurre en recién nacidos, y describe diversas respuestas a la aplicación de presión a ambas palmas. Los bebés pueden mostrar flexión de la cabeza, rotación de la cabeza, apertura de la boca, o una combinación de estas respuestas.	
REFLEJO DE MARCHA AUTOMÁTICA	1 MES	consiste en que el recién nacido muestra un movimiento de piernas en determinadas posiciones como si quisieran andar	
REFLEJO DE SUPRAPUBICO	1 MES	Al presionar encima del pubis se produce una extensión tónica de las piernas, con aducción, rotación interna, equino de los pies y separación de los dedos.	

REFLEJO DE EXTENSIÓN CRUZADA	1 MES	Flexión de una pierna y presión sobre el cotilo, la otra hace una extensión tónica, con aducción, rotación interna, equino y separación de los dedos.	
REFLEJO ACÚSTICO FACIAL (RAF)	A partir del MES de vida	Se coloca al niño en alguna posición donde se encuentre distraído, puede ser jugando, y es en ese momento que el evaluador da una palmada en una zona cercana al oído. La respuesta esperada es que el niño cierre los ojos.	
REFLEJO DE OJOS DE MUÑECA	Hasta 6ª SEMANA.	Es un reflejo tónico-vestibular. Al girar pasivamente la cabeza, los ojos quedan durante un breve periodo de tiempo fijos, siguiendo luego la dirección del giro.	
REFLEJO DE ROOTING	3 MESES	Reflejo de los puntos cardinales, al estimular en zona perioral, la boca e incluso la lengua se orienta hacia el estímulo en las cuatro direcciones.	

<p>REFLEJO DE BUSQUEDA Y SUCCIÓN</p>	<p>3 o 4 MESES</p>	<p>Si toca suavemente su mejilla, el bebé volteará la cabeza en dirección del estímulo con la boca abierta listo para succionar. Si coloca algún objeto en su boca, por ejemplo el seno materno, este lo succionará.</p>	<p style="text-align: center;">Reflejo de Busqueda</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>3</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Reflejo de succión</p>
<p>REFLEJO DE MORO</p>	<p>4 MESES.</p>	<p>Se desencadena en decúbito supino dejando caer hacia atrás la cabeza, o bien con una palmada fuerte. Se produce abducción de hombro con extensión de codo, seguido de aducción de hombro con flexión de codo.</p>	
<p>REFLEJO DE GALANT</p>	<p>4 MESES</p>	<p>El niño debe estar suspendido por el vientre. Se hace una presión paravertebral desde debajo de la escápula hasta encima de la cresta ilíaca, produciéndose una flexión lateral hacia el lado estimulado.</p>	

<p>REFLEJO DE TONICO-CERVICAL ASIMÉTRICO</p>	<p>6 MESES</p>	<p>Al girar pasivamente la cabeza se extiende la extremidad superior del mismo lado y se flexiona la del lado contralateral.</p>	
<p>REFLEJO DE PRENSIÓN PALMAR</p>	<p>6 MESES.</p>	<p>Consiste en cerrar fuertemente la mano cuando se estimula la palma del bebé al presionarla con algún objeto</p>	
<p>REFLEJO DE PARACAÍDAS</p>	<p>a partir del 6^o-7^o mes y no desaparece en toda la vida</p>	<p>Es una reacción muscular en la que el niño apoya sus brazos y piernas, en una posición similar a la de un paracaidista cuando se lanza desde un avión y espera tocar tierra. El bebé extenderá los brazos hacia adelante como para interrumpir la caída.</p>	

REFLEJO DE BABINSKI	6 MESES y 2 AÑOS	Cuando se le pasa suavemente la mano por la planta del pie desde el talón hasta el dedo gordo, levanta los dedos y voltea el pie hacia adentro.	