



**Nombre de alumnos: Oded Yazmin
Sánchez Alcázar**

**Nombre del profesor: Dr. Cancino
Gordillo Gerardo**





Nombre del trabajo: Capurro

Materia: Crecimiento y Desarrollo

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 3

Grupo: A

<p>FORMA DE LA OREJA. (PABELLON)</p>	<p>aplana da sin incurvación</p>  <p>10</p>	<p>Borde superior parcialmente incurvado.</p>  <p>8</p>	<p>Todo el borde sup. incurvado.</p>  <p>16</p>	<p>Pabellon totalmente incurvado</p>  <p>24</p>
<p>Tamaño de la glandula mamaria</p>	<p>no palpable</p>  <p>10</p>	<p>Palpable menor de 5 mm.</p>  <p>5</p>	<p>Palpable entre 5 y 10 mm</p>  <p>10</p>	<p>Palpable mayor de 10mm</p>  <p>15</p>
<p>Formación del pezón</p>	<p>A penas visible sin areola.</p>  <p>10</p>	<p>Diametro menor de 7.5mm areola lisa y cheta.</p>  <p>5</p>	<p>Diametro menor de 7.5 mm areola punteada.</p>  <p>10</p>	<p>Diametro mayor 7.5mm areola punteada.</p>  <p>15</p>
<p>Textura de la piel</p>	<p>Muy fina gelatinosa</p> <p>0</p>	<p>Fina lisa</p> <p>5</p>	<p>Mas gruesa discreta descamacion superficial.</p> <p>Mas gruesa discreta descamacion superficial</p> <p>10</p>	<p>Gruesa grietas superficiales descamacion de manos y pies</p> <p>de</p> <p>Gruesa grietas profundas apergamina-das</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>20</p>
<p>Pliegues plantares</p>	<p>sin pliegues.</p> <p>0</p>	<p>marcas mal definidas en mitad anterior</p> <p>5</p>	<p>Marcas bien definidas en la mitad anterior.</p> <p>10</p>	<p>Surco mitad anterior.</p> <p>15</p> <p>Surco en mas de la mitad anterior.</p> <p>20</p>

Formula

Se suma 204 + puntaje y se divide entre 7

Ejemplo: Si un recién nacido tiene estas características

Características	El recién nacido tiene	Puntaje
Forma de la oreja	Palablon ^{Parcialmente Incurvado} borde superior	8
Tamaño de G. mamaria.	Palpable entre 5 y 10mm	10
Formación del Pezón	Diámetro mayor de 7.5mm areola punteada B. levantada	10
Textura de la piel	mas gruesa, descoloración superficial discreta	5
Pieques Plantares	Marcas mal definidas en la mitad anterior	5
	Total de puntos	43

Se utiliza la formula:

$$\frac{\text{total de puntos} + 204}{7 \text{ (días)}} = \text{Semanas de gestación}$$

$$\frac{43 + 204}{7} = \frac{247}{7} = 35 \text{ Semanas}$$


el metodo tiene un error de +/- una semana.

El test de capurro es un criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato.

Postmaduro.	42 Semanas o más
A término	37 y 41 Semanas.
Prematuro leve	35 y 36 Semanas
Prematuro moderado	32 y 34 Semanas
Prematuro extremo	Menos de 32 Sema.

FORMA DE LA OREJA.

Se trata de observar (no tocar) la incurvación que hace hacia afuera el pabellón de la oreja.



pliegues plantares

Se observara la planta de ambos pies y luego hiperextiende ambas de manera que se mantenga tensa la piel de la planta.

Dependiendo de la cantidad de surcos se Valora 0, 5, 10, 15, 20

Pliegues Plantares					
	Sin pliegues	Marcas mal definidas en la mitad anterior	Marcas bien definidas en la 1/2 anterior, Surcos en 1/2 anterior	Surcos en la mitad anterior	Surcos en mas de la mitad anterior
	0	5	10	15	20
esta	Sin pliegues	marcas mal definidas en la mitad anterior	Marcas bien definidas en la 1/2 anterior	Surcos en la mitad anterior	Surcos en mas de la mitad anterior
	0	5	10	15	20

Textura de la piel

palpe y examine la piel de las antebrazos manos pievas y pies observe si en el dorso de las manos y pies hay líneas de descamación o grietas.

Dependiendo de la profundidad de las grietas o la presencia de descamación Valare 0, 5, 15, 20

textura de la piel	Muy fina gelatinosa	Fina lisa	Más gruesa discreta descamación superficial	Gruesa grietas superficiales descamación de manos y pies	Gruesa grietas profundas apergamina-das
	0	5	10	15	20
	0	5	10	15	20

formación del pezón

Evaluar ambos pezones y con una cinta metrica medir si el diametro es apenas visible > 7,5 mm > 7,5 mm pero con el borde no levantado o > 7,5 mm pero con areola punteada y bordes levantados.

formación del Pezon	Apenas visible sin areola	Diametro menor de 7,5 mm. Areola lisa y chata	Diametro mayor de 7,5mm. Areola punteada Borde No levantado	Diametro mayor de 7,5mm. Areola punteada Borde levantado
	0	5	10	15
	0	5	10	15
	apenas visible sin areola.	Diametro menor de 7,5 mm areola lisa, chata.	Diametro Mayor de 7,5mm areola punteada.	Diametro Mayor de 7,5 mm areola punteada.

Tamaño de la glandula mamaria

Utilice una cinta metrica y con la otra mano palpe el tejido que se encuentra por debajo y alrededor del pezón tratando de especificar si se palpa o no tejido y si el diametro es < 5 de 5 a 10 ó > 10 mm.

Tamaño de la glandula Mamaria.	No Palpable	Palpable menor de 5 mm.	Palpable entre 5 y 10 mm.	Palpable mayor de 10 mm.
	0	5	10	15
	0	5	10	15
	no palpable	Palpable menor de 5 mm.	Palpable entre 5 y 10 mm	palpable Mayor de 10mm

Capurro, R. (2017). *Pediatría. revista mexicana neonatología y conocimiento*, 4(1), 11-30.

Konichezky, S., (2018). A simplified method for diagnosis of gestational age in the newborn infant. *The Journal of pediatrics*, 93(1), 120-122.

Gutiérrez, A.. (2018). Validez del método simplificado por capurro en el cálculo de la edad gestacional. *Bol. Hosp. Niños JM de los Ríos*, 33(2), 55-9.

Hidalgo D. (2019). relación entre edad gestacional y evaluación neonatal según test de capurro, en gestaciones a termino tardio en el hospital materno infantil carlos showing ferrari–huánuco, 2017.