



# **Universidad del Sureste**

**Licenciatura en Medicina Humana**

**Materia:**

**Crecimiento y desarrollo**

**Docente:**

**Dr. Gerardo Cancino Gordillo**

**Tema:**

**Cuadro: herramienta para valoración de Capurro**

**Alumno:**

**Diego Lisandro Gómez Tovar**

**3 B**

**Comitán de Domínguez, Chiapas a**

**25 de octubre de 2020.**

Forma de la oreja (Pabellón)

 0	 8	 16	 24
Aplanada, Sin incurvación	Borde superior parcialmente incurvado	Todo el borde sup incurvado.	Pabellón totalmente incurvado.


Tamaño de glándula mamaria.

 0	 5	 10	 15
No palpable	Palpable menor de 5 mm.	Palpable entre 5 y 10 mm	Palpable mayor de 10 mm



Formación del pezón

 0	 5	 10	 15
Apenas visible sin areola	Diámetro < 7.5 mm Areola lisa y chata	Diámetro mayor de 7.5 mm Areola punteada	Diámetro mayor de 7.5 mm Areola punteada.

Textura de la piel.

 0	 5	 10	 15	 20
Muy fina gelatinosa	Fina lisa	Más gruesa discreta descamación superficial	Gruesa, grietas superficiales descamación de manos y pies	Gruesa, grietas profundas pergamina-das.

Pliegue plantares.

 0	 5	 10	 15	 20
Sin pliegues	Marcas mal definidas en la mitad anterior	Marcas bien def. en la 1/2 anterior, surcos en 1/3 anterior	Surcos en la mitad anterior	Surcos en más de la mitad anterior

Post maduro:	42 sem o más	} $\begin{aligned} \text{Edad gestacional (días)} = \\ \frac{200 + \text{Total de puntos}}{7} \end{aligned}$
A término.	37 - 42 sem	
Prematuro leve	35 - 36 sem.	
Prematuro moderado	32 - 34 sem.	
Prematuro extremo.	< 32 semanas.	

Bibliografía:

Protocolo de Atención del Recién Nacido/a de Bajo Riesgo