



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Materia:

Crecimiento y desarrollo

DR. Gerardo Cancino Gordillo

Presenta:

Fátima Andrea López Álvarez

3* B



Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 25/10/20

TEST DE CAPURRO

ESTIMACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL

Es un criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato el test considera el desarrollo de 5 parámetros fisiológicos y cuatro características que combinadas dan la estimación basada

Forma de la oreja	Clavado como tuberculo no marcado 	Tuberculo visible pero no marcado en el borde superior 	Distinción visible hacia todo el borde superior 	Tuberculo marcado y gran marcado 	
Tamaño de la Glándula mamaria	No palpable 	Palpable menor de 5mm 	Palpable entre 5 y 10 mm 	Palpable mayor de 10 mm 	
Formación del Pezón	Apenas visible sin areola 	Diámetro menor de 13 mm areola lisa y convexa 	Diámetro menor de 8 y 9 mm areola hundida entre 4 tuberculos 	Diámetro mayor de 13 mm areola hundida y tuberculos areolares 	
Textura de piel	MUY fina y gelatinosa 	Fina, lisa 	Más gruesa descomposición superficial discreta 	Gruesa, gruesa descomposición discreta en mareas y fisas 	Gruesa, gruesa Profundas aperturadas 
Pliegues Plantares, Surcos, líneas bien definidas, líneas mal definidas	3-4 pliegos 	Marcos mal definidos en 1/2 anterior 	Marcos mal definidos en la 1/2 anterior y en 1/2 posterior 	Surcos en 1/2 anterior 	Surcos en más de la 1/2 anterior 

Puntuación:

- Postmaduro = 42 + 30c
- A término = 37 = 41 = 30c
- Prematuro leve = 33 = 36 = 30c
- Prematuro moderado = 32 = 34 = 30c
- Prematuro extremo = 32 = 30c

Formula =

Se suma 204 + puntaje + 30 divide entre 7

REFERENCIA:

- Martínez y Martínez. La salud del niño y del adolescente, 5° edición, editorial SALVAT 2005.