



**Universidad del Sureste**  
**Escuela de Medicina**

**Materia:**

**CRECIMIENTO Y DESARROLLO**

**PRESENTA:**

**BRENDA JACQUELINE RUIZ PADILLA**

**DOCENTE:**

**DR. GERARDO CANCINO GORDILLO**

**Lugar y fecha**

**Comitán de Domínguez Chiapas a**  
**22/09/2020**

## REFLEJOS PRIMITIVOS EN EL RECIEN NACIDO

NOMBRE DEL REFLEJO	EXPLORACION	PATOLOGIAS	EDAD	IMAGEN
<b>SUCCION</b>	al estimular con el meñique la parte media de la lengua o el paladar, se provoca la succión sobre el dedo.	A NIVEL MOTOR, RELACIONADO AL NERVIOS TRIGEMINO <ul style="list-style-type: none"> <li>• RN CON INMADUREZ</li> <li>• HIPERTONIA/HIPOTONIA</li> </ul>	DESDE LA 8va A 13 SEMANA DE GESTACION Y SE INHIBE HASTA LOS 9 U 12 MESES.	
<b>MORO</b>	En supino, realizando una tracción sobre las manos hacia delante y soltando bruscamente sobre la camilla de exploración, se produce primero abducción de brazos y extensión de antebrazos con apertura de manos (primer tiempo), seguido de aducción de brazos y flexión de antebrazos (segundo tiempo) acompañado generalmente de llanto o ansiedad.	DEFICIENCIA O LESIONES GRAVES A NIVEL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	DESDE LA SEMANA 28 DE GESTACION DESAPARECE A LOS 3-6 MESES	
<b>GALANT</b>	En posición prono, el roce de la región paravertebral, produce incurvación de la columna hacia el lado estimulado.	AUSENCIA: INDICA LESION DE LA MEDULA ESPINAL SI PERSISTE, DESPUES DE LA EDAD: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENURESIS NOCTURNA</li> <li>• ESCOLIOSIS</li> </ul>	DESDE LAS 20 SEMANAS DE GESTACION HASTA 4 A 11 MESES	
<b>ACUSTICO FACIAL</b>	Se desencadena al dar una palmada cerca del oído del RN, este deberá de cerrar los ojos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HIPOACUSIA</li> </ul>	DESDE EL 10 DIA DE VIDA Y NO DESPARECE	

NOMBRE DEL REFLEJO	EXPLORACION	PATOLOGIAS	EDAD	IMAGEN
<b>PRESION PALMAR</b>	Al introducir el pulgar en mano se produce la flexión de los dedos	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	DE 4-5 meses	
<b>BUSQUEDA</b>	Al tocar la mejilla: desviación de la comisura bucal y giro de cabeza hacia ese lado		DESAPARECE AL MES DE VIDA	
<b>MARCHA AUTOMÁTICA</b>	En posición vertical al apoyar los pies, da unos pasos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LESION SEVERA CEREBRAL</li> </ul>	Desaparece al mes (patológico >3 meses)	
<b>PRESION PLANTAR</b>	Al introducir el pulgar en mano se produce la flexión de los dedos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TENSION EN EL TENDON DE AQUILES</li> <li>•</li> </ul>	DE 9-12 meses	

NOMBRE DEL REFLEJO	EXPLORACION	PATOLOGIAS	EDAD	IMAGEN
<b>REFLEJO OPTICO FACIAL</b>	Parpadeo al aproximarle un objeto a la cara		Patológico si no aparece al 6.º mes	
<b>PARACAIDAS</b>	Al inclinar al niño hacia el frente: extiende EESS y se apoya en palmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PARALISIS CEREBRAL</li> </ul>	Aparece al 6.º mes	
<b>SUPRAPUBICO</b>	Tras una presión suprapúbica, realiza una extensión tónica de las extremidades inferiores con aducción con equino		Desaparece al mes (patológico >3 meses)	
<b>CRUZADO EXTENSOR</b>	Al realizar presión sobre el cotilo con la pierna flexionada se produce una extensión tónica con equino de la extremidad contralateral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LESIONES NEUROLOGICAS</li> </ul>	Desaparece al mes y medio (patológico >3 meses)	