

UNIVERSIDAD DEL SURESTE ESCUELA DE MEDICINA

MATERIA:

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

CATEDRÁTICO:

DR. GERARDO CANCINO GORDILLO

PRESENTA:

VANESSA ESTEFANÍA VÁZQUEZ CALVO

TRABAJO:

Reflejos primitivos en el recién nacido

GRADO Y GRUPO:

3 ° B

LUGAR Y FECHA:

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

REFLEJOS PRIMITIVOS DEL RECIEN NACIDO				
NOMBRE DEL REFLEJO	DESCRIPCIÓN	EDAD NORMAL	PATOLOGÍAS	IMAGEN
SUCCIÓN	Se introduce un dedo en la boca del RN para observar la fuerza y ritmo de la succión.	Semana 28-36		
BABINSKI	Cuando se le pasa suavemente la mano por la planta del pie desde el talón hasta el dedo gordo, levanta los dedos y voltea el pie hacia adentro.	6 meses a 2 años		

BABKIN	Al apretar al niño las manos abre la boca.	1 mes		
ROOTING	Se estimula en zona perioral, la boca e incluso la lengua se orienta hacia el estímulo en las cuatro direcciones.	3 meses		
OJOS DE MUÑECA	Se gira pasivamente la cabeza, los ojos quedan durante un breve periodo de tiempo fijos, siguiendo luego la dirección del giro.	Sexta semana		
MARCHA AUTOMÁTICA	En posición vertical al apoyar	1 mes		

	los pies, da unos pasos.			
TONICO-CERVICAL ASIMÉTRICO	Al girar pasivamente la cabeza se extiende la extremidad superior del mismo lado y se flexiona la del lado contralateral	6 meses		
SUPRAPUBICO	Al presionar encima del pubis se produce una extensión tónica de las piernas, con aducción, rotación interna, equino de los pies y separación de los dedos	1 mes		

EXTENSIÓN CRUZADA	Flexión de una pierna y presión sobre el cotilo, la otra hace una extensión tónica, con aducción, rotación interna, equino y separación de los dedos.			
MORO	El examinador toma las manos del RN y levanta los hombros unos pocos centímetros, mientras mantiene la espalda y la cabeza sobre la cama; entonces	4 meses		

	súbitamente se liberan las manos.			
ENDEREZAMIENTO	Haciendo presión sobre los pies del niño se produce un enderezamiento progresivo desde la zona caudal a la apical.			
GALANT	El niño debe estar suspendido por el vientre. Se hace una presión paravertebral desde debajo de la escápula hasta encima de la cresta ilíaca, produciéndose una flexión lateral	4 meses		

	hacia el lado estimulado.			
PRENSIÓN PALMAR	Se colocan los dedos índices del examinador en las palmas de las manos del RN por el lado cubital, y en forma gentil se presiona sobre la superficie palmar. El RN flexiona los dedos alrededor del dedo índice.	6 meses		
PRENSIÓN PLANTAR	Al presionar la almohadilla plantar se flexionan los dedos. Al realizar los reflejos de prensión no	10 meses		

	debe tocarse el dorso de la mano o del pie.			
ACUSTICO FACIAL	Parpadeo al hacer un ruido brusco.	A partir de 1 mes de vida		
ÓPTICO FACIAL				

