

Universidad del Sureste Escuela de Medicina

Materia:

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Presenta:

Polet Viridiana Cruz Aguilar

3ºB

Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 22 de septiembre del 2020

REFLEJOS PRIMITIVOS

IMAGEN	REFLEJO	
	De succión	<p style="text-align: center;">Valoración:</p> <p>Introduce un dedo en la boca del RN para observar la fuerza y ritmo de la succión.</p> <p style="text-align: center;">Edad en la que se encuentra:</p> <p>Comienza alrededor de la semana 32 del embarazo, y no se desarrolla completamente hasta las 36 semanas</p> <p style="text-align: center;">Sospecha de patología:</p> <p style="text-align: center;">Trastorno a la deglución Posibles malformaciones congénitas</p>
	Marcha automática	<p style="text-align: center;">Valoración:</p> <p>Se mantiene el RN en posición vertical, tomándolo por el tronco y levantándolo o inclinándolo ligeramente hacia adelante. El RN camina hacia delante conforme cada pie tiene contacto con la superficie.</p> <p style="text-align: center;">Edad en la que se encuentra:</p> <p>Se observa desde el séptimo mes de gestación y desaparece hacia los 3 meses de vida</p> <p style="text-align: center;">Sospecha de patología:</p> <p>Signo patológico en el desarrollo psicomotor</p>
	Moro	<p style="text-align: center;">Valoración:</p> <p>Se coloca al bebé boca arriba y sosteniéndole por los brazos se le incorpora un poco separando la cabeza de la camilla, enseguida se la deja caer (sobre la mano del examinador) y entonces se produce una respuesta con la siguiente secuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. extensión y separación de los brazos del tronco y extensión de los dedos de las manos 2. vuelve a juntar los brazos, como abrazando el aire 3. a menudo emite un grito 4. la posición de las piernas es variable <p style="text-align: center;">Edad hasta la que se encuentra:</p> <p style="text-align: center;">Duración de dos meses</p> <p style="text-align: center;">Sospecha de patología:</p> <p>Efectos neurológicos severos Sobrecarga sensorial, ansiedad y emociones e inmadurez social</p>

	<p>Busqueda</p>	<p>Valoración: Este reflejo se produce cuando se toca o acaricia la comisura de los labios del bebé. El bebé gira la cabeza y abre la boca para seguir y "buscar" en la dirección de la caricia. Esto ayuda al bebé a encontrar el pecho o el biberón para alimentarse.</p> <p>Edad hasta la que se encuentra: Dura alrededor de 2-4 meses</p> <p>Sospecha de patología: Afección de carácter motor</p>