

# **Universidad del Sureste**

## **Escuela de Medicina**

**Materia:**

**CRECIMIENTO Y DESARROLLO**

**Tema:**

**“METODO DE CAPURRO”**

**Docente:**

**Gerardo Cancino Gordillo**




**Alumno:**

**Oswaldo Morales Julián**

**3- “B”**










**Lugar y fecha**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 25/10/2020.**

<p>Forma de la Oreja</p>	<p>Ortoto-deforme Pabellón no incurvado</p> 	<p>Pabellón parcialmente incurvado en el borde superior</p> 	<p>Pabellón incurvado en todo el borde superior</p> 	<p>Pabellón totalmente incurvado</p> 	
<p>Tamaño de la Glándula mamaria</p>	<p>No palpable</p> 	<p>Palpable: menor de 5cm</p> 	<p>Palpable: entre 5 y 10 mm</p> 	<p>Palpable: mayor de 10mm</p> 	
<p>Formación del pezón</p>	<p>Apenas visible sin areólas</p> 	<p>Diámetro menor de 7.5mm Areóla sin bordes y chota</p> 	<p>Diámetro mayor a 7.5mm Areóla pintada, Borde no elevado</p> 	<p>Diámetro mayor de 7.5mm Areóla pintada. Borde levantado</p> 	
<p>Textura de la Piel</p>	<p>Muy fina: Glatrosa</p> 	<p>Fina: Lisa</p> 	<p>Más grueso: Descamación superficial discreta</p> 	<p>Grueso: Grietas superficiales Respiración en manos y pies</p> 	<p>Grueso: Grietas profundas afersaminados</p> 
<p>Pliegues Plantares</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surcos</li> <li>• Líneas bien</li> <li>• Líneas mal definidas</li> </ul>	<p>Sin pliegues</p> 	<p>Marcos mal definidos en la mitad ante.</p> 	<p>Marcos bien definidos en la mitad ant. Surcos en la mitad ant.</p> 	<p>Surcos en la mitad anterior</p> 	<p>Surcos en más de la mitad anterior</p> 

Formula:  $\frac{204+P}{7}$

Postmaduro	42 semanas o más
A término	entre 37 y 41 semanas
Prematuro leve	entre 35 y 36 semanas
Prematuro moderado	entre 32 y 34 semanas
Prematuro externo	menos de 32 semanas

Forma de la Oreja	Chato-deforme Pabellón no incurvado 	Pabellón parcialmente incurvado en el borde superior 	Pabellón incurvado en todo el borde superior 	Pabellón totalmente incurvado 	
Tamaño de la glándula mamaria	No palpable 	Palpable: menor de 5mm 	Palpable: entre 5 y 10 mm 	Palpable: mayor de 10mm 	
Formación del Pezón	Apenas visible sin de alas 	Diámetro menor de 7.5mm Areola sin bordes y chata 	Diámetro mayor a 7.5mm Areola pintado. Borde no elevado 	Diámetro mayor de 7.5mm Areola pintado. Borde levantado 	
Textura de la Piel	Muy fina. Glatnosa 	Fina. Lisa 	Mas grueso. Decoloración superficial discreta 	Grueso. Grietas superficiales Respiración en manos y pies 	Grueso. Grietas profundas opercaminadas 
Pliegues Plantares	Sin Aliegues 	Marcas mal definidas en la mitad ante. 	Marcas bien definidas en la mitad ant. surcos en la mitad ant. 	Surcos en la mitad anterior 	Surcos en más de la mitad anterior 

Formula:  $\frac{204+P}{7}$

Postmaduro	42 semanas o más
A término	entre 37 y 41 semanas
Prematuro leve	entre 35 y 36 semanas
Prematuro moderado	entre 32 y 34 semanas
Prematuro externo	menos de 32 semanas

## “Bibliografía”

Lioncourt, A. (2017). *Método de capurro para determinar la edad gestacional*. slideshare. <https://es.slideshare.net/scarletisbell/mtodo-de-capurro-para-determinar-la-edad-gestacional>

*Puntos a tratar. Crecimiento y desarrollo antenatal*. (2017). odont.info. <https://odont.info/puntos-a-tratar-crecimiento-y-desarrollo-antenatal.html>