



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina



Materia: Crecimiento y desarrollo

Dr: Gerardo Cancino Gordillo

Alumna: Guadalupe Elizabeth González González

Reflejos primitivos

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 22/09/2020.

<p>Reflejo de succión</p>	<p>Se introduce un dedo en la boca del RN para observar la fuerza y ritmo de la succión. La sincronía de la succión y la deglución se evalúa durante la alimentación.</p>	
<p>Prensión palmar y respuesta a la tracción.</p>	<p>Se colocan los dedos índices del examinador en las palmas de las manos del RN por el lado cubital, y en forma gentil se presiona sobre la superficie palmar. El RN flexiona los dedos alrededor del dedo índice. Cuando el examinador levanta los dedos índices, se aprecia una respuesta de tracción en los músculos flexores del brazo. El RN de término puede sostener todo su cuerpo por esta respuesta de tracción.</p>	
<p>Reflejo de Moro</p>	<p>El examinador toma las manos del RN y levanta los hombros unos pocos centímetros, mientras mantiene la espalda y la cabeza sobre la cama; entonces súbitamente se liberan las manos. El reflejo normal es una abducción de los brazos y flexión de los antebrazos. La abertura completa de las manos ocurre en la primera fase.</p>	
<p>Marcha automática</p>	<p>Se mantiene el RN en posición vertical, tomándolo por el tronco y levantándolo o inclinándolo ligeramente hacia adelante. El RN camina hacia adelante conforme cada pie tiene contacto con la superficie.</p>	
<p>Bóveda palatina.</p>	<p>Al frotar gentilmente la mejilla cerca de la boca, el RN mueve la cara hacia el mismo lado, abre la boca e intenta succionar.</p>	

