

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Materia:

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Cuadro METODO DE CAPURRO

Dr. Gerardo Cancino Gordillo

Alumna. Heydi Antonia Coutiño Zea

3-“B”

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 25/10/2020.

METODO DE CAPURRO

Forma de la OREJA (Pabellón)	Tamaño de GLÁNDULA MAMARIA	Formación del PEZÓN	TEXTURA de la PIEL
<p>Aplanada, sin incurvación</p>  <p>0</p>	<p>No palpable</p>  <p>0</p>	<p>Apenas visible sin cresta</p>  <p>0</p>	<p>Muy fina granulosa</p>  <p>0</p>
<p>Borde superior parcialmente incurvado</p>  <p>8</p>	<p>Palpable menor de 5 mm</p>  <p>5</p>	<p>Discreto menor de 3,5 mm Ancho 150 y 180 µm</p>  <p>5</p>	<p>Fina fina</p>  <p>5</p>
<p>Todo el borde sup. incurvado</p>  <p>16</p>	<p>Palpable entre 5 y 10 mm</p>  <p>10</p>	<p>Discreto mayor de 3,5 mm Ancho 180 y 200 µm</p>  <p>10</p>	<p>Más gruesa, discreta de escamación superficial</p>  <p>10</p>
<p>Pabellón totalmente incurvado</p>  <p>24</p>	<p>Palpable mayor de 10 mm</p>  <p>15</p>	<p>Discreto mayor de 3,5 mm Ancho 200 y 250 µm</p>  <p>15</p>	<p>Gruesa gruesa de escamación de escamación de escamación y pliegos</p>  <p>15</p>
			<p>Gruesa gruesa incluídas opergeminadas</p>  <p>20</p>



PLIEGUES PLANTARES

Sin pliegues		0	Manchas muy definidas en la mitad anterior		5	Manchas bien definidas en la 1/2 anterior y surcos en la parte posterior		10	Surcos en la mitad anterior		15	Surcos en más de la mitad anterior		20
--------------	---	---	--	---	---	--	--	----	-----------------------------	---	----	------------------------------------	---	----

Posmoduro 42 semanas o más

A término 39 a 41 semanas

Pretermo 35 a 36 semanas

Letar 29 a 34 semanas

Preterminal 23 a 27 semanas

Extremo



Se suma 204 + Puntaje parcial y se divide entre 7

