

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Materia:

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Tema:

“REFLEJOS PRIMITIVOS”

Docente:

Gerardo Cancino Gordillo

Alumno:

Oswaldo Morales Julián

3- “B”

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 22/09/2020.

REFLEJOS PRIMITIVOS	Descripción	Edades en las que se encuentran	Patologías	
REFLEJO DE BÚSQUEDA U HOCIQUEO	Este reflejo se presenta cuando se acaricia la mejilla del bebé. El bebé girará la cabeza hacia el lado acariciado y comenzará a hacer movimientos de succión con la boca	Esta reacción continúa hasta los 4 meses	Daño cerebral Accidente cerebrovascular	
REFLEJO DE PRENSIÓN	Este reflejo se presenta si usted pone un dedo en la palma de la mano abierta del bebé. La mano se cerrará alrededor del dedo. El intento de retirar el dedo hace que el agarre se apriete.	Se presenta durante las primeras semanas de vida, generalmente hasta los cuatro o seis meses de edad.	Si más allá de los seis meses continúa como conducta refleja se puede considerar como signo patológico en el desarrollo.	
Reflejo de prensión plantar	Consiste en cerrar los dedos del pie cuando se estimula el pulgar del pie del bebé al presionarla con algún objeto	Desaparece a los 9 meses.	Si el reflejo persistiera, sería imposible que el bebé comenzara a caminar normalmente, ya que se impediría el apoyo plano del pie en el suelo	
Reflejo de babinski	Se presenta después de que se ha frotado firmemente la planta del pie. El dedo gordo del pie entonces se mueve hacia arriba o hacia la superficie superior del pie. Los otros dedos se abren en abanico	Es normal en niños hasta los 2 años de edad.	Es un signo de un trastorno del sistema nervioso central. El sistema nervioso central incluye el cerebro y la médula espinal	