

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE

## Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

### Propedéutica, Semiología y Diagnóstico Clínico

Cuadro comparativo

### Linfoma Hodgkin y No Hodgkin

Docente:

Dra. Angelita Yessenia Gómez Gallardo

Alumno:

Víctor Eduardo Concha Recinos

Semestre y Grupo:

4° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 3 de Noviembre de  
2020.

## Diferencias Clínicas de:

Linfoma Hodgkin	Linfoma No Hodgkin
Cáncer del sistema inmunario que se caracteriza por la presencia de células denominadas Reed-Sternberg.	Cualquier grupo de cánceres de linfocitos caracterizados por ganglios linfáticos más grandes de lo normal.
Localizado en un solo grupo ganglionar axial (cervical, mediastínico, paravertebral)	Afectación más frecuente de múltiples ganglios peritóreos
Dispersión ordenada por contigüidad.	Se disemina pero no por contigüidad.
Ganglios mesentéricos y anillo de Waldeyer raramente afectados.	Afectación frecuente del anillo de Waldeyer y ganglios mesentéricos
Presentación extraganglionar infrecuente.	Presentación extraganglionar habitual.
Puede un mejor pronóstico	Puede peor pronóstico en la mayoría de los casos.

La importancia del diagnóstico rápido y oportuno se centra en encontrarlo en sus etapas iniciales para tener mejores pronósticos y más opciones de tratamiento, algunas ocasiones es más sencillo, ya que se presentan signos y síntomas desde el inicio.

Después del diagnóstico, la clasificación de la enfermedad según su etapa, proporciona información importante sobre que tanto se ha propagado el linfoma, así como la información anticipada sobre la respuesta que habrá con el tratamiento.

# Hodgkin

# No Hodgkin

