

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE

## Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

### Propedéutica, Semiología y Diagnóstico Clínico

Cuadro comparativo

### Linfoma Hodgkin y No Hodgkin

Docente:

Dra. Angelita Yessenia Gómez Gallardo

Alumno:

Erick José Villatoro Verdugo

Semestre y Grupo:

4° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 3 de Noviembre de  
2020.

# LINFOMAS

Enick José Villatoro  
Verdugo  
28 10 20

Característica	Hodgkin	No Hodgkin
<b>Definición</b>	Cáncer del sistema linfático que se caracteriza por la presencia de células de Reed-Stenberg.	Cáncer de tejido linfático, situado en ganglios linfáticos, bazo y otros órganos del sistema linfático.
<b>Afección</b>	Localizado preferentemente en un solo grupo de ganglios axiales.	Suele afectar a muchos ganglios periféricos.
<b>Diseminación</b>	Diseminación por contigüidad, siguiendo un orden previsible.	No se extienden por contigüidad.
<b>Prevalencia</b>	Rara vez afecta a los ganglios mesentéricos y al anillo de Waldayer.	Suele afectar al anillo de Waldayer y a los ganglios mesentéricos.
<b>Incidencia</b>	Personas jóvenes (15-40 años) más común en hombres que en mujeres, buen pronóstico de vida. (Supervivencia 95%)	Es más común en adultos que en jóvenes y niños, con un peor pronóstico. (Supervivencia 70%)

Importancia: Es de suma importancia realizar un diagnóstico oportuno, certero y rápido, ya que esto nos ayudará a poder tener más opciones en cuanto al tratamiento, aunque a esto, nos da más un talpa sobre el pronóstico de la salud de nuestro paciente, en especial linfoma No Hodgkin, ya que en estos los médicos suelen medir por talpa de supervivencia el pronóstico de las personas pero no indican el tiempo de vida cabe mencionar.