



Universidad del Sureste
Licenciatura en Medicina Humana

Título:

Cuadro Comparativo de Linfoma Hodgkin y No Hodgkin

Materia:

Propedéutica, Semiología y Diagnostico Físico

Docente:

Dra. Gómez Gallardo Angelita Yesenia

Alumno:

Vazquez Saucedo William

Semestre:

4°A

Comitán de Domínguez; Chiapas, 3 de Noviembre de 2020

Cuadro comparativo

LINFOMA HODKIN	LINFOMA NO HODKIN
- Caracterizado por la presencia de células de Reed-Sternberg (aunque no son patognomónicas).	- Las células suelen variar según el tipo de linfoma.
- Localizado en un solo grupo ganglionar axial (cervical, mediastínico, paraaórtico)	- Afectación más frecuente de múltiples ganglios periféricos.
- Dispersión ordenada por contigüidad	- Se disemina pero no por contigüidad
- Ganglios mesentéricos y anillo de Waldeyer raramente afectados.	- Afectación frecuente del anillo de Waldeyer y ganglios mesentéricos.
- Presentación extraganglionar infrecuente.	- Presentación extraganglionar habitual.
- Posee un mejor pronóstico	- Presenta un peor pronóstico en la mayoría de los casos.
- No leucemizan	- Muchos casos leucemizan
- Según la O.M.S representan al grupo V	- Según la O.M.S representan al grupo I, II, III, y IV