

Universidad del Sureste

Escuela de Medicina Humana

SEMESTRE:

4º A

MATERIA:

PROPEDEUTICA, SEMIOLOGIA Y DIAGNOSTICO

TRABAJO:

FACIES PATOLOGICAS

DOCENTE:

Dra. GOMEZ GALLARDO ANGELITA YESENIA

ALUMNO (A):

REYNOL PRIMITIVO GORDILLO FIGUEROA

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS, 27/SEP/ 2020.

- Face reflexiva

• Conoce en la colocación anómala de la cara y de los conductos por sumisión de la bilaminación superior, se ve en reflexos hemilíricos, por expresión de bilaminación y por obstrucción en se el miración.



- Face de viso sacudida

• Se observa que en el momento de la fuente de un tipo, los ojos, la nariz se elevan, las comisuras labiales. Sin embargo, cuando se ve y hace abuya, al tiempo que los labios contractados descubren los dientes. Durante los días en conjunto con el tipo de viso pensante, de viso sacudida, o espasmo laríngeo.



- Face Coagratific

• Con palidez y subejeo excesivo maxilar. Comisuras frías y tenues, con un finc-pudoroso. Se presentan en desnutrición y en neoplasias.



- Face adonética

• Boca enfundada, cara alzada indicada adonética, pómulos aplastados, nariz y labio superior muy pequeños y proximidad de la mandíbula superior. Es causada por la pérdida de dientes.



- Face deonna

• Caracterizada por el hábito deprimido de la piel de la cara, donde se expresa el efecto de la cara. En la infancia en la forma de puntos de la enfermedad de Hirschsprung.



- Face Parthenoniana

• Uñas fimbriadas. El tiempo de la mirada fija, falta de expresión de rasgos expresivos. La cara se muestra en la enfermedad de Parkinson.



- Face Hiedemulosa

• Cara oblongada. P. de gracia, palidez, edema palpebral, engrosamiento de la nariz y de la labio. Expresión indolente. Se encuentra en caso de edema (hipotiroideoismo del adulto)



- Face Mongólica

• Cara redonda, hinchada palpable abultada y en pliegue en el ángulo interno (epicanto). Hipertelorismo, ojos pequeños en una mirada, dilatación, engrosamiento de pómulos y la nariz (Carina Clara). Se encuentra en 5 años de edad (p. caso 21)



- Face Hipofisaria

• Profundidad de globos oculares (carotidoma) en o b. lateral. Mandíbula y bilabio, espasmo maxilar. Se le muestra en hipofunción hipófisis, en la enfermedad de Cushing-Baxdow.



- Face Asimétrica

• De la parte superior de la cara, con una de las partes laterales. Desarrollo de la mandíbula palpable (epicanthion) por presión del ángulo de los párpados, (epicanthion) desarrollo de la nariz, labio y del surco nasogeniano, desarrollo de comisura.



