

# UNIVERSIDAD DEL SURESTE

## Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Propedéutica, Semiología y Diagnóstico clínico.

Marco conceptual:

ETS (Presentes en hombres)

Docente:

Angelita Yesenia Gómez Gallardo

Alumno:

Erick José Villatoro Verdugo

Semestre y Grupo:

4° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 06 de Enero del 2021.

## ETS (Hombres)

### Gonorrea

Afecta al tracto genitourinario, al recto, a veces a los ojos, con posibles infecciones hematógenas a las membranas sinoviales

Puede manifestarse como cervicitis, uretritis, proctitis, conjuntivitis, con secreción blanco amarillenta espesa.

Si no es tratada, puede conducir en los varones a una peri uretritis o a una epididimitis.

### Chancro blando

Producto de *Haemophilus Ducreyi* y en un 70% de los casos es por vía sexual su transmisión.

Afecta más al sexo masculino, y su periodo de incubación es de 3 a 7 días

Aparecen en los genitales: pápulas suaves, redondas, rodeadas de eritema

Las cuales en un periodo de 24 a 48 horas se harán pústulas y se erosionarán.

Formando úlceras sucias, con bordes mal definidos, cubiertas de una costra gris amarillenta necrótica.

### UNG

Son de las más frecuentes en hombres, es más común que la gonocócica.

Tiene varios agentes, un 40% es por *Chlamydia Trachomatis*, el *Ureaplasma urealyticum* un 10% y lo demás es de origen idiopático.

En el caso de la *Chlamydia* es muy poco común en hombres.

Clínicamente se presenta disuria, exudado uretral de aspecto mucoso en el meato más prominente durante las mañanas.

### Linfogranuloma venereo

Su agente causal: *Clamidia Trachomatis* (Serotipos L1, L2 y L3 (Principalmente afecta a asiáticos, militares y viajeros)

Afecta más a los varones, su periodo de incubación comienza de 3 a 30 días después de la infección.

Se divide en estadios, en el primero existen úlceras herpetiformes, pápulas eritematosas dolorosas, etc.

El segundo estadio trae consigo linfadenopatías, diseminación hematológica, fiebres, mialgias, anorexia y vómitos.

El terciario, solo se hace presentes en mujeres,

### Candidiasis

Se presentan formas mucosas balanítica, y se consideran por transmisión sexual.

Principalmente producida por *Candida Albicans*

Se manifiesta con secreciones blanquecinas, acompañada de prurito

Pero es mucho más común encontrar en hombres la zona balanoprepucial con eritema y secreción blanquecina

En casos de Parasitismo, algunos parásitos se pueden transmitir por vía sexual (Como el Oxiuro)

### Trichomoniasis

No está completamente definida la cantidad de población masculina que ha sido afectada por esta enfermedad

Es común encontrar manifestaciones clínicas en los varones como uretritis, epididimitis y en algunas ocasiones prostatitis.