

Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Propedéutica, semiología y diagnóstico físico.

Trabajo:

Cuadro de diferencias clínicas comparativas de la enfermedad por linfoma hodking y linfoma no hodking.

Docente:

Dra. Angelita Yesenia Gómez Gallardo.

Alumno:

Citlali Berenice Fernández Solís.

Semestre y grupo:


4º "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a 03 de noviembre del 2020.

DIFERENCIAS CLINICAS COMPARATIVAS DE LA ENFERMEDAD POR UNFOMA HODKING Y UNFOMA NO HODKING:

Linfoma Hodking:

1. Es un cáncer del sistema linfático, en el cual las células crecen de manera anormal y se pueden esparcir más allá del sistema linfático.
2. Localizado preferentemente en un solo grupo de ganglios axiales (cervicales, mediastínicos, paraaórticos).
3. Diseminación por contigüidad siguiendo un orden previsto.
4. Rara vez afecta a los ganglios mesentéricos y el anillo de Waldeyer.
5. Rara afectación extraganglionar.



Linfoma no Hodking:

1. Afecta de igual manera al sistema linfático del cuerpo pero en este caso las células cancerígenas empiezan a crecer de forma descontrolada, lento o rápido y puede propagarse a otras partes del cuerpo (hígado, cerebro o médula ósea).
2. Suelen afectar a muchos ganglios periféricos.
3. No se extiende por contigüidad.
4. Suelen afectar el anillo de Waldeyer y los ganglios mesentéricos.
5. Frecuente afectación extraganglionar.

