

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Propedéutica, Semiología y Diagnóstico clínico.

Marco conceptual:

ETS (En hombres)

Docente:

Angelita Yesenia Gómez Gallardo

Alumno:

Reynol Primitivo Gordillo Figueroa

Semestre y Grupo:

4° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 06 de Enero del 2021.

ENFERMEDADES DE TRANSMICION SEXUAL EN HOMBRES

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un grupo heterogéneo de infecciones transmisibles a través de las relaciones sexuales que no necesariamente son transmitidas con penetración sexual.

Se clasifican en

Clásicas curables

No curables

Sífilis

Producida por *Treponema pallidum*, es altamente infecciosa. Su periodo de incubación es de 10-90 días. Consta de tres periodos:

1. Sífilis primaria: Se presenta como una ulcera genital indolora de color ajamonado brillante y con bordes elevados.

2. Sífilis secundaria: dentro de este periodo se observan 4 síndromes característicos:

-Síndrome cutáneo: se observan maculas y pápulas en la piel del tronco y extremidades.

-Síndrome mucoso: lesiones opalinas (manchas blancas nacaradas), erosivas (exulceraciones mucosas parecidas a las aftas bucales) e hipertróficas (pápulas de las mucosas).

-Síndrome de los anejos: Alopecia en zonas temporo parietales de bordes mas o menos definidos. Se puede presentar alopecia en otras partes del cuerpo como cejas y pestañas,

-Síndrome general: Malestar general como: fiebre, faringitis, cefalea, faringoamigdalitis, dolores en articulaciones, en ocasiones hepatitis.

3. Sífilis terciaria: se observan nódulos y gomas en la piel, huesos y vísceras que se destruyen localmente dejando cicatrices. Se presentan manifestaciones cardiovasculares y en el sistema nervioso central en ocasiones.

Gonorrea

Producida por contacto sexual, afectando el tracto genitourinario y el recto, en ocasiones puede afectar los ojos y con una posibilidad de infección hematógena a las membranas sinoviales y serosas. Se puede manifestar como cervicitis, uretritis, proctitis y conjuntivitis, con secreción blanco-amarillenta espesa. Si no se trata, se puede complicar a peri uretritis y

Chancro blando

Producido por *Haemophilusducreyi*. Su periodo de incubación es de 3-7 días presentándose en los genitales pápulas suaves y redondas, rodeadas de eritema que se llegan a transformar en pústulas y erosionan, lo cual forma úlceras sucias de bordes mal definidos y cubiertos por una costra gris amarillenta necrótica.

Linfogranuloma venéreo

Producida por *Clamidia trachomatis* serotipo L1, L2 y L3. Se presenta en tres estadios:

1. Estadio primario: Luego de 3-30 días se observan papulas eritemosas dolorosas de 3 a 8 mm o úlceras herpetiformes, profundas y que desaparecen a los pocos días. Se puede presentar eritema nudoso y multiforme, urticaria y exantema.

2. Estadio secundario: Aparecen infadenopatías y diseminación hematógena con fiebre, mialgia, vómitos, fotosensibilidad. En la región inguinal aparecen

Granuloma inguinal

Es producida por *Kiebsiellagranulomatis*. Tiene un periodo de incubación de 3 semanas a 3 meses. Se presenta como pápulas o nódulos en los genitales, estos crecen y se desarrollan como una úlcera grande, rojiza que no duele, el tejido es granuloso y provoca mal olor. Pueden generarse condilomas.

SIDA

Posee un aspecto clínico en el que abundan formas leves o inaparentes en los portadores, pero en su forma grave y complicada presenta un alta letalidad entre menores de 60 años.

Se presenta en su forma cutánea como: dermatitis seborreica, molusco contagioso, herpes zoster, entre otras. Los signos pueden presentarse a partir del primer año, sin embargo pueden pasar muchos años antes de ser conocidos debido a su nula presencia de síntomas.

Dentro de los síntomas se pueden encontrar: Diarrea crónica, severa, persistente y en muchos casos sanguinolenta. Esto origina anemia, pérdida de peso, desequilibrio hidroelectrolítico.

También se presenta Fiebre. Puede presentarse un tipo de fiebre con carácter intermitente y persistente.

Herpes simple

Producido por el virus del herpes simple tipo II. Se presenta clínicamente con un grupo de lesiones eritematosa vesiculosas de contenido claro, transparente en los genitales externos. Puede acompañarse de prurito y síntomas locales como ardor y hormigueo. Desaparece en una semana pero vuelve a reaparecer en cualquier momento relacionado a factores como estrés, traumas, etc.