



Universidad del Sureste
Licenciatura en Medicina Humana

Título:

Estructuras Anatómicas de una Radiografía Abdominal

Materia:

Imagenología

Docente:

Dr. Cancino Gordillo Gerardo

Alumno:

Vazquez Saucedo William

Semestre:

4°A

Comitán de Domínguez; Chiapas, 22 de Septiembre de 2020

Estructuras Anatómicas de una Radiografía Abdominal

Estructuras Anatómicas	¿Cómo sueles Observarla?	Región
Estomago	Se observa una formación radiolúcida que corresponde al gas de la cámara estomacal. (burbuja gástrica)	El estómago se sitúa en 2 regiones superiores del abdomen, una porción de esta estructura se lo caliza en el Hipocondrio Izquierdo y la otra en el Epigastrio.
Hígado	La sombra hepática desde el hipocondrio derecho terminando en el ángulo hepático situado en el hipocondrio izquierdo.	El hígado se sitúa en las 3 regiones superiores del abdomen con una mayor porción en el Hipocondrio Derecho que continua por el Epigastrio y se extiende una pequeña porción hacia el Hipocondrio Izquierdo.
Riñones	Se visualizan las siluetas renales, se observan como estructuras radiopacas.	El riñón derecho y la glándula suprarrenal respectiva se sitúa en el hipocondrio Derecho y el riñón izquierdo con su respectiva glándula suprarrenal se sitúa en el hipocondrio izquierdo.
Bazo	Se visualiza la sombra del bazo, será una formación radiopaca.	Se ubica en la región del Hipocondrio izquierdo.
Páncreas	Normalmente no es visible en Rx simple de abdomen	Se ubica en el Mesogastrio a nivel de L1-L2
Intestino Grueso	Se observan sombras que será el gas de estas estructuras, serán formaciones radiolúcidas.	En la región de flanco derecho se encuentra el ángulo hepático del colon y el colon ascendente. Flanco izquierdo se encuentra el ángulo esplénico del colon y el colon descendente. En el mesogastrio el colon transverso. En la fosa iliaca derecha e izquierda se ubica el ciego y sigmoides respectivamente. Y en le Hipogastrio se encuentra el recto.
Intestino Delgado	Se observan sombras que será el gas de estas estructuras, serán formaciones radiolúcidas.	El ángulo duodeno yeyunal a nivel de L2-L3 se sitúa en el mesogastrio, en la fosa iliaca derecha se encuentra el segmento distal del íleo.
Psoas	Gracias a la grasa que se encuentra alrededor de estas estructuras de los riñones se aprecian los psoas	Situados en la parte posterior desde Epigastrio hasta ambas fosas iliacas.
Pelvis (Ósea)	Son estructuras Oseas, serán formaciones radiopacas	La pelvis mayor, con sus paredes ensanchadas hacia adelante con la región abdominal inferior, las fosas ilíacas e hipogastrio. Contiene parte de las vísceras abdominales. La pelvis meno
Columna Lumbar (Ósea)	Se observan los cuerpos vertebrales, serán formaciones radiopacas	Se ubica en la región del Epigastrio, Mesogastrio e Hipogastrio.



