



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina

Caso clínico

Docente: Sergio Alejandro López Ruíz

Materia: Psiquiatría

Alumno: Lara Vega Ismael

Semestre 5to Grupo A

9/enero/2021

CASO CLÍNICO

Álvaro Álvarez Alvarado, un adulto de 38 años de edad que se dedica a la albañilería es ingresado a servicio de urgencias acompañado de un familiar, debido a un comportamiento agresivo, juicio alterado y alteraciones del estado neurológico.

El familiar comenta que el señor Álvaro le llamó para recogerlo, siendo este contexto en la calle, y al verlo, decidió llevarlo al hospital puesto que se veía muy mal, también comenta que Álvaro tuvo una ingesta reciente de alcohol. Al momento de realizar exploración física, el paciente tenía disartria, descoordinación, marcha insegura, alteraciones de la atención y memoria y olor a alcohol en el aliento. El familiar afirma que el señor Álvaro no padece de otras afecciones psiquiátricas y médicas como esclerosis múltiple, diabetes, ataxia cerebelosa, y otras también niega el consumo de fármacos, antihistamínicos, anticolinérgicos y otros sedantes, siendo esto comprobado gracias a los resultados toxicológicos en sangre.

DIAGNÓSTICO

-Intoxicación por alcohol

-CIE-10: F10.929= Sin algún trastorno concomitante

EXPLICACIÓN

La característica esencial de dicha intoxicación se refiere al desarrollo de un síndrome específico y reversible debido a la ingesta reciente de la sustancia (**Criterio A**). El señor Álvaro, como comenta su familiar y a como se le encontró en el servicio de urgencias, tuvo cambios psicológicos clínicamente significativos (agresividad) que aparecen luego de la ingesta de dicha sustancia (**Criterio B**).

Luego de la ingesta de alcohol por parte del paciente se hallaron algunos síntomas tales como disartria, descoordinación, marcha insegura, alteraciones de la atención y memoria (**Criterio C**).

El familiar del señor Álvaro, al momento de hacerle un interrogatorio ayuda a concluir que los signos y síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica, y

de igual manera no se pueden explicar mejor por otro trastorno mental, incluida una intoxicación con otra sustancia tales como benzodiazepinas, fármacos anticolinérgicos, antihistamínicos, entre otros depresores del sistema nervioso central (**Criterio D**).

Los marcadores diagnósticos a los que hace referencia el DSM-5 mencionan que la intoxicación por alcohol se suele detectar mediante la observación del comportamiento y el olor a alcohol de un individuo. El grado de intoxicación aumenta según el nivel de alcohol en la sangre o en el aliento y cuando se han ingerido otras sustancias, en especial las que tienen efectos sedantes.