



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Medicina física y de rehabilitación

Cuadro comparativo de dolor

Dr. Antonio de Jesús Pérez Aguilar

Thania Guadalupe López Guillén

TIPOS DE DOLOR

Explicados por Cheems



DOLOR AGUDO	DOLOR CRONICO
<p>Es de inicio reciente con una duración menor de 6 meses</p> 	<p>Continuo/intermitente con una duración mayor a 6 meses</p> 
<p>Consta de respuestas autónomas con respuesta simpática de lucha o huida</p> 	<p>Ausencia de las respuestas autónomas</p> 
<p>Se relaciona ampliamente con la ansiedad</p> 	<p>Tiene un mayor índice de aumento de la irritabilidad, depresión, aislamiento de intereses externos</p> 
<p>Sirve como sistema de alarma ante la existencia de daño tisular</p> 	<p>Es variable y muchas veces llega a ser insoportable</p> 
<p>Suele ser súbito</p> 	<p>Presenta cambios en el apetito</p> 

Dolor somático cutáneo	Dolor somático profundo	Dolor visceral	Dolor referido
Estructuras superficiales	Estructuras corporales profundas	Origen en órganos viscerales	Dolor percibido en un sitio distinto a su punto de origen
Cualidad ardosa	Es más difuso que el cutáneo	Es similar al dolor somático Induce dolor intenso	Esto se debe a que recibe inervación por el mismo segmento raquídeo
Abrupto o de inicio lento	Presión sobre un hueso, isquemia y daño tisular pueden provocarlo	Cambia por la percepción del dolor y del daño que provoca	El dolor se origina en las vísceras, suele ser difuso y mal localizado
Se puede distribuir a lo largo de los dermatomas	El dolor puede llegar a irradiarse	Hay una divergencia funcional de impulso visceral dentro del SNC la cual se presenta en las neuronas de 2do orden desde una sola aferente visceral	Mantienen una inervación y difusión de acuerdo al origen embrionario