



**Universidad del Sureste**



**Escuela de Medicina**

**“RESUMEN”**

---

**Materia:**

**Medicina física y de rehabilitación**

**Docente:**

**Antonio de Jesús Pérez Aguilar**

**Alumno:**

**Tarsis Andrea Guillén Narváez**

**Semestre:**

**5° “A”**

## ESCALA DE WAGNER Y SAN ELIAN.

Definimos pie diabético como el conjunto de síndromes en los que la existencia de neuropatía, isquemia e infección provocan alteraciones tisulares o úlceras secundarias a microtraumatismos, ocasionando una importante morbilidad que puede devenir en amputaciones

## ESCALA WAGNER

Existen diversos tipos y grados de úlcera diabética según la afectación del pie. De forma habitual las úlceras están localizadas en la planta del pie (rara vez en el dorso). La clasificación más usada es la Escala de Wagner.

Grado	Lesión	Características
0	Ninguna, pie de riesgo.	Callos gruesos, cabezas metatarsianas prominentes, dedos en garra, deformidades óseas.
1	Úlceras superficiales.	Dstrucción total del espesor de la piel.
2	Úlceras profundas.	Penetra en la piel, grasa ligamentos pero sin afectar al hueso, infectada.
3	Úlceras profundas más absceso.	Extensa, profunda, secreción y mal olor.
4	Gangrena limitada	Necrosis de parte del pie.
5	Gangrena extensa	Todo el pie afectado, efectos sistémicos.

## San Elián

El sistema de clasificación de las lesiones consta de 10 variables propias de la lesión, que a su vez se subdividen en leve, moderado y grave, para finalmente obtener un puntaje que categorice en: grado I (leve, buen pronóstico para la cicatrización exitosa), grado II (moderado, amenaza parcial, los resultados son dependientes de una terapéutica adecuada aplicada [Lex artis medica ad hoc] y asociado a la respuesta biológica del paciente) y grado III (grave, amenaza para la extremidad afectada y la vida). Los resultados son independientes de la correcta terapéutica y respuesta biológica del paciente)

**Cuadro I.** Cuadro de seguimiento y repuntuación de la evolución de la herida.\*

Paciente:						
Fecha						
Procedimiento terapéutico**						
Factores: leve (1), moderado (2) y grave (3)						
Localización inicial (1-3)						
Aspectos afectados (1-3)						
Número de zonas afectadas (1-3)						
Isquemia (0-3)						
Infección (0-3)						
Edema (0-3)						
Neuropatía (0-3)						
Área (1-3)						
Profundidad (1-3)						
Fase de cicatrización (1-3)						
Puntaje						
Diferencia						
Grado						
Médico: nombre y firma						
Hospital o clínica						

\* Sistema de San Elián. Recalificar cuantas veces sea necesario.\*\* Intervención quirúrgica (desbridación, amputación menor o mayor, revascularización, etcétera) y/o procedimientos adyuvantes (VAC, piel sintética, injertos, cámara hiperbárica, etcétera).



## BBLIOGRAFIAS

- <https://www.medigraphic.com/pdfs/felac/fl-2012/fl121e.pdf>
- [archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/gua-de-prctica-clnica-en-el-pie-diabtico.pdf](http://archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/gua-de-prctica-clnica-en-el-pie-diabtico.pdf)

