



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina



Nombre: Ana Lucia Hernández Saenz

Materia: Medicina Física y de Rehabilitación

Docente: Dr. Antonio de Jesús Pérez

Semestre: 5to "A"

Tema: parásitos que afectan la piel

Fecha: 27 / 09 / 2020

PARASITOS QUE AFECTAN LA PIEL

Las enfermedades causadas por parásitos animales que causan lesiones en la piel, se dividen en tres grupos:

- ✚ **Ectoparasitosis.** Presencia del parásito por encima de la piel o se introduce en sus capas más superficiales con o sin sensibilización del huésped. En este grupo se encuentran la escabiasis, las pediculosis, la larva *migrans*, las miasis, la trombidiasis y la tunguiasis.
- ✚ **Parasitosis subcutáneas y profundas.** Alude a la presencia del parásito en las capas más profundas de la piel o en los órganos. En este rubro participan: leishmaniasis, amebiasis, oncocerciasis, gnatostomiasis o larva *migrans* profunda, larva *migrans* visceral, tripanosomiasis, filariasis, biliarziasis.
- ✚ **Parasitosis reaccionales.** Hipersensibilidad a parásitos no presentes en la piel.

Parasitosis más frecuentes:

Escabiasis

La escabiasis o sarna es una parasitosis cutánea producida por *Sarcoptes scabiei* var. *hominis*, fácilmente transmisible, familiar y un motivo frecuente de consulta. Afecta a personas de todas las clases sociales, de cualquier edad y sexo, aunque es más frecuente en quienes priva el desaseo y la promiscuidad.

Es una enfermedad que se presenta de manera cíclica, originando pequeñas o grandes epidemias, se dice que suele aparecer cada 10 a 12 años y sin razón aparente declina y casi desaparece otros tantos años.

Debido a su alta transmisibilidad se considera un padecimiento familiar, de asilos, escuelas, cárceles y cuarteles militares, y ha llegado a afectar hasta 90% de la población de pequeños pueblos.

La escabiasis es una enfermedad exclusivamente cutánea y muy pruriginosa, que afecta extensas áreas del cuerpo, mismas que varían según la edad de la persona: en los lactantes las lesiones suelen verse en todo el cuerpo con predominio de piel cabelluda, palmas, plantas y pliegues corporales.

En el niño mayor y en el adulto, las lesiones quedan limitadas entre dos líneas (líneas de Hebra), una que pasa por los hombros y otra que pasa por las rodillas. No hay lesiones en la cabeza y muy pocas en piernas y pies. Aunque las lesiones aparecen en cualquier parte de esas regiones situadas entre las dos líneas de Hebra, existen sitios afectados muy peculiares cuyo reconocimiento es útil para el

diagnóstico, como son: cara anterior de las muñecas y borde interno de las manos, pliegues interdigitales, cara interna de antebrazos, axilas, región periumbilical, pliegue interglúteo, escroto y pene, y en la mujer, areola y pezón.

