



**Universidad del Sureste**

**Escuela de Medicina**

**“Cuadro descriptivo”**

---

**Materia:**

**Medicina física y de rehabilitación**

**Docente:**

**Antonio de Jesús Pérez Aguilar**

**Alumno:**

**Tarsis Andrea Guillén Narváez**

**Semestre:**

**5° “A”**

TIPO DE DOLOR	DESCRIPCION POR SU UBICACIÓN Y TIPO DE REFERENCIA				
	CLASIFICACION	FIBRAS PREDOMINANTES	CRITERIO CLINICO	DESENCADENANTES	EJEMPLO
<b>Dolor somático</b>	-Superficial -Profundo	Mielinicas A(A $\alpha$ , A $\delta$ )	Se trata de un dolor localizado, agudo, punzante o pulsátil -Límites precisos, bien localizados	-Estimulación de termorreceptores (mayores de 45°C o menores de 5°C) -Estimulación de mecanorreceptores (pinchazo, corte, golpe, etc.) -Nociceptores	El más frecuente es el dolor óseo producido por metástasis óseas
<b>Dolor visceral</b>	--	Amielinicas o C	Es sordo, profundo, difuso, descrito como presión o tracción. -Limite imprecisos, mal localizado, en general referido a la línea media	-La distensión espontánea o experimental -La isquemia -La inflamación	Los dolores de tipo cólico, metástasis hepáticas y cáncer pancreático.
<b>Dolor neuropático</b>	--	Vías nerviosas	Permanente, o intermitente episodios de variedad intensidad y duración	Puede originarse por la lesión de las vías nerviosas en una región determinada y coexistir con un déficit para otros tipos de sensibilidad	
<b>Dolor funcional o Psicogénico</b>	--	--	Carecen de sustrato estructural evidenciable	Interviene el ambiente psico-social que rodea al individuo.	Neurosis, hipocondriaco

TIPO DE DOLOR	DESCRIPCION POR SU DURACION	
	CRITERIO CLINICO	EJEMPLO
<b>Dolor crónico</b>	Ilimitado en su duración, se acompaña de componente psicológico.	Es el dolor típico del paciente con cáncer.
<b>Dolor agudo</b>	Limitado en el tiempo, con escaso componente psicológico.	La perforación de víscera hueca, el dolor neuropático y el dolor musculoesquelético en relación a fracturas patológicas.

TIPO DE DOLOR	DESCRIPCION POR SU INTENSIDAD	
	CRITERIO CLINICO	EJEMPLO
<b>Dolor leve</b>	Puede realizar actividades habituales.	Golpes leves
<b>Dolor moderado</b>	Interfiere con las actividades habituales	
<b>Dolor severo</b>	Interfiere con el descanso.	

## **Bibliografía**

H., A., & M., A. (s.f.). *Semiología Médica, fisiopatología, semiotecnia y propedutica*. Buenos Aires: panamerica.