

CUADRO DESCRIPTIVO DEL DOLOR.



- **Materia:** Medicina física y de rehabilitación
- **Docente:** Dr. ANTONIO DE JESUS PEREZ AGUILAR
- **Carrera:** Medicina Humana
- **Grado y Grupo:** 5° B
- **Alumno:** Adrián Espino Pérez

CAUDRO DESCRIPTIVO DEL DOLOR SEGÚN EL TIEMPO

DOLOR AGUDO	es una experiencia, normalmente, de inicio repentino, duración breve en el tiempo y con remisión paralela a la causa que lo produce. Existe una relación estrecha temporal y causal con la lesión tisular o la estimulación nociceptiva provocada por una enfermedad. De manera menos frecuente, puede asociarse etiológicamente con un proceso neuropático, por ejemplo la neuralgia del trigémino. Su duración se extiende desde pocos minutos a varias semanas.
DOLOR CRONICO	se extiende más allá de la lesión tisular o la afectación orgánica con la que, inicialmente, existió relación. También puede estar relacionado con la persistencia y repetición de episodios de dolor agudo, con la progresión de la /s enfermedad/es, con la aparición de complicaciones de las mismas y con cambios degenerativos en estructuras óseas y musculoesqueléticas. Ejemplos de lo dicho son el cáncer, fracturas patológicas secundarias, artrosis y artritis, neuralgia postoperatoria, etc.

DOLOR SEGÚN SU FISIOPATOLOGÍA

MECANISMO FISIOPATOLOGICO	DENOMINACIÓN	CLINICA
Nociceptivo	SOMATICO	Sordo, continuo, bien localizado, similar a pinchazo o presión
	VISERAL	Mal localizado, mordedura, calambre en viscera hueca, continuo y cortante si maciza.
Neuropático	Sistema Nervioso Central ó Periférico	Dolor por desafereñación Mono y polineuropatías Síndrome de dolor regional complejo
No somático	Sin patología orgánica	Evaluación minuciosa interdisciplinar. DESCONFIAR EN DOLOR NEOPLÁSICO

SEGÚN SU EVOLUCIÓN

NOMBRE	SUBCLASIFICACIÓN	DEFINICIÓN
Dolor continuo		aún con ascensos y descensos de intensidad, persiste a lo largo del día.
Dolor episódico	INCIDENTAL: INTERMITENTE: FALLO FINAL DE DOSIS:	aparece asociado a alguna actividad, tos, caminar, apoyo, defecación, etc. de manera espontánea, sin un factor desencadenante conocido. aparece antes de tomar la dosis de un analgésico para el que está existiendo una respuesta adecuada.