



UNIVERSIDAD DEL SURESTE



ESCUELA DE MEDICINA

5to Semestre

Grupo "B"

Medicina física y de rehabilitación

11 DE OCTUBRE DEL 2020

**Dr. PEREZ AGUILAR
ANTONIO DE JESUS**

Resumen

**ESCALA DE WEGNER Y SAN
ELIAN**

Presenta:

- **Diana Montserrath de León Pérez**

ESCALA DE WEGNER Y SAN ELIAN

REGIÓN ANATÓMICA	FACTORES AGRAVANTES	AFECCIÓN TISULAR
<p>Localización: 1-3</p> <ol style="list-style-type: none"> Falanges Metatarsal Tarsal 	<p>Isquemia 0-3</p> <ol style="list-style-type: none"> NO Leve Moderada Severa 	<p>Profundidad: 1-3</p> <ol style="list-style-type: none"> superficial ulcera profunda (bajo la dermis) todas las caps
<p>Aspectos topográficos: 1-3</p> <ol style="list-style-type: none"> Dorsal Lateral o medial Dos o más 	<p>Infección: 0-3</p> <ol style="list-style-type: none"> No Leve: Eritema <2cm/ Induración/ Dolor Calor/ Exudado purulento Moderada: Eritema >2cm/ Infección de musculo/ Tendón / Hueso o articulación Severa: Respuesta inflamatoria sistémica 	<p>Área: 1-3</p> <ol style="list-style-type: none"> Pequeña < 10 cm Pequeña 10-40 cm Grande > 40 cm
<p>Zonas afectadas: 1-3</p> <ol style="list-style-type: none"> Una Dos Todo el pie 	<p>Edema: 0-3</p> <ol style="list-style-type: none"> No Perilesional Solo 1 pierna afectada Bilateral secundario a enfermedad sistémica 	<p>Fase de cicatrización: 1-3</p> <ol style="list-style-type: none"> Epitelización Granulación Inflamatorio
	<p>Isquemia: 0-3</p> <ol style="list-style-type: none"> NO 	

-
- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Sensibilidad protectora o vibratoria disminuida2. Perdida de sensibilidad protcetor o vibratoria3. Neuro-osteo-artopatia diabética de Charcot |
|--|

Esta clasificación fue desarrollada en México a partir del estudio de 235 sujetos diabéticos y dada a conocer en el año 2010 por Martínez de Jesús.

Cada variable se puntúa con una puntuación que oscila del 1 al 3, estableciéndose unos grados de severidad:

I-Leve (puntuaciones menores a 10 puntos)

II-Moderado (puntuaciones de 11 a 20 puntos)

III-Severo (puntuaciones de 21 a 30 puntos)

Referencias:

Clasificaciones de lesiones en pie diabético, Gerokomos vol.29 no.4 Barcelona dic. 2018.

Recuperado de : http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2018000400197